


0 1 2 3 4 5

122. 705 1611

10:





















R

16c

72025







72025

2007



72025






72,025

# DE PARTV

HOMINIS, ET QVAE CIRCA IPSVM  
accidunt. Libellus D. Eucharij  
Rhodionis, Medici.



72,025

FRANC, Chri. Egen.

ERVDITISS. VIRO D. EVCHARIO

Rhodioni, Medicinæ-Licentiato peritiss. Medico

Francofurtensi. Christianus Egenolphus. S. D.

Hominem, siue primorum parentū delicto, siue alio  
quopiam diuino consilio, inter cætera animãtia, ut quã  
ægerrime, neque procul à mortis periculo progenerã  
ri, ita quã facillime interire, si cui non satis testatum,  
euentus certe ipse cotidie ponit ob oculos. Nil mirũ ita-  
que, si ortũ nostrũ penitus cõsiderãtes, & uitæ, uti quæ  
nõ paruo cõsisterit, et omnis conuersationis nostræ, nõ  
mediocrem sinus habituri rationem. Quare, ornatiss.  
uir, illectus, ut opinor, olim humanitatis tuæ, cui benè sit  
in Domino, genitor. Cuius in hac urbe tuet nomẽ refers  
& functionẽ, libellum quendã de partu hominis, et quæ  
circa ipsum accidũt edidit Germanice, qui in tot mille  
descriptus exemplaria, nõ mediocri parturientũ, obste-  
tricũ, ac Medicorũ deniq; compendio, tota distrahitur  
Germania. Eum multoties exterarũ Nationum eruditi  
complures latino ideomate excudi, à me cũ plerisq; ali-  
is, cõtendebãt. Germanos, quibus indies eiusmodi in om-  
ni disciplinæ genere uenustuli exoriãtur libelli, se lōge  
foeliciores causãtes. Quorũ precibus cõ alacrius, quod  
ide quasi hereditario iure, ad eruditionẽ tuã, cui omnia  
debeo, ac opt. parentẽ, non uulgarẽ honorem reductorũ  
præuiderim, obsequutus, amico cuidã docto iuxta ac sin-  
cero in latinam linguã libellũ uertendum detuli, qui uel  
tua causã, quæ est uiri humanitas, id laboris libens sus-  
bijt, licet à sua professione, id opus ualde esset alienum.

Quam

Quāquā, ut ego puto, ob hāc versionem, nō minus illi se Latini, quā Germani tuo parenti de editio-  
ne Germanica debere fatebuntur. Vale. Anno. 1532.

P R O L O G V S .



Osteatq̃ Coelestis ille re-  
rum omnium parens De-  
us, secundum ineffabi-  
lem suam prouidentia ho-  
minem ab initio creatum,  
aeternae uitae atq̃ foelicitati destinauit, non  
satis ille quidem habuit, corpus hoc sensi-  
bus ac membris aptū atq̃ perfectū ut est  
ex nihilo creasse, nisi etiam eas insuper do-  
tes illi adderet, quibus ea quae ad alendum  
& conseruandum illud pertinent, inueni-  
re, atq̃ dijudicare posset. Proinde pro sum-  
ma illa sua erga nos beneuolentia, mentem  
ac rationem, nobis indidit, quibus quod ad  
coelestia pertinet, ad ipsum q̃ proxime ac-  
cederemus, diuinitatisq̃ tanquam partici-  
pes essemus, & quod ad curam nostri atq̃  
humani corporis spectat, omnia quibus  
ad alendam & custodiendam hanc uitam  
indagare atq̃ cognoscere possemus. Nam

A ij

& hinc arbitror tot præclariss. hominum ingenia, non solum in his inferioribus atq; terrenis rebus circa plantarum, ac seminū potestates atq; naturam occupata fuisse, nerum etiam in cœlum usq; sensibus, atq; cogitatione ascendisse, syderumq; rationes ac motus, ipsamq; totius uniuersi harmoniam & effectum perscrutādo, quid quoquo modo hominum vitę atq; incolumitati conferret aut contra noceret, multiplici studio atq; diligentia didicisse. Tales enim videmus vetustissimum quidem illum Hypocratem, & qui post eum secuti sunt, Galienum, Auicennam, Rasim, atq; alios, quos hic numerare necesse nō est, qui beneficio atq; virtute Dei, eonſq; euaserunt, ut quęcunq; vel ad præseruandam vel ad restituendam vitę humanę incolumitatem, necessaria forēt, ea & ingenijs deprehendisse & ipsa omnibus præstitisse viderentur. Quorum quidem exemplo, cum omnes nos, qui eadem illa studia ingressi sumus, ea quę ab illis prodita, & accepta sunt, aliorum vsui atq; vtilitati, quantū fieri potest tradere debeamus, equidem turpe mihi futurum



curum putavi, si non pro mea quoque facultate, humanæ vitæ atque incolumitati aliqua parte profuissem, præsertim cum non omnibus tot ac tanta illorum volumina euoluere liceat, & nostrorum temporum malignitas, doctorum Medicorum copiam non passim aut semper præbeat. Porro cum multa sunt, quorum cognitio his temporibus ut rara, ita valde necessaria est, tamen in parte aliqua documentum studiorum ac diligentiae meæ exhibere malui, quam toto opere periclitari, & ceu figulinam in dolio, ut dicitur, auspicari. Et quia in hisce regionibus, in quibus mihi hætenus viuere contigit, multa ac varia pericula circa prægnantes, earumque partus, accidere solent, quod ea plerumque quibus obstetricandi munus commissum est, per imperitiã minus ea quæ parientibus, aut ex partu laborantibus prosunt, aut contrã obsunt, intelligunt ac uident. Constitui breues quasdam velut commentarios super ea re componere, ex quibus meo quidem iudicio, facile omnia illa, quæ obesse solent, cura præuerti, aut ea quæ aduersa accidere, curari atque restitui possunt.

A iij

Quamquidem meam operam non ijs solum ad quos ea maxime pertinet, vtilem, sed etiam ijs qui animum ad hec studia perdiscenda adpulerunt, & in vniuersum omnibus studiosis gratam fore existimo, præcipue cū nihil tam deformis ubiq; sit, quam hominem literis atq; eruditione alijs præstantem, ipsum suæ generationis atq; originis rationem atq; modum nescire. Cæterū totus hic libellus duodecim capitibus continetur, quorum quid in vnoquoq; docetur, infra ex ordine subnotauimus.

Cap. I. Quo situ atq; habitu paratus in utero quiescit, & quot pelliculis idem circumuoluitur.

Cap. II. Quod tempus pariendi, & qui partus naturales, & qui contra naturam fiunt.

Cap. III. De facili partu, et difficili, et quo pacto facilitas aut difficultas hec cognosci potest.

Cap. IIII. Quid parientibus maxime agendum, & quomodo ægre parientibus subueniendum est.

Cap.

Cap. V. Remedia, quæ partum adiuvant, & facilem reddunt.

Cap. VI. Quomodo Secundina è parturientibus eximenda, si ea sponte sua non discessura sit.

Cap. VII. Varij casus, qui circa, aut etiam post partum mulieribus accidunt, quo pacto & quibus remedijs præverti, atq; curari debent.

Cap. VIII. De Abortientibus, & causis Abortuum, & quibus remedijs iisdem præcaueri possint.

Cap. IX. De partibus emortuis, & quibus signis cognoscantur, & quomodo.

Cap. X. De recens natis quomodo fovendi, alendi, & curandi sint.

Cap. XI. De lacte, & nutrice, & quâ diu infanti mamma præbenda.

Cap. XII. De varijs morbis & casibus in quos recens nati incidere solent, & quomodo iisdem curandi.

A iij

Tradituro mihi de partu hominis, & quæ circa ipsum parientibus accidunt, necesse videtur antea quàm ad ipsam rem accedã, de situ atq; dispositione, quomodo in utero se partus habent, non nihil commonere. Neq; enim facile quæ consequuntur, intelligi possunt, ubi causas & principia ex quibus quæque nascuntur, ignoramus.

**Q**VO SITV AC HABITV, PARTVS  
*in utero quiescit, & quot pelliculis idem circumuoluitur.* CAP. I.

**P**Artus igitur in utero ad hunc modum se habet. Principio ipsum quidem caput, in genua prouum decumbit, manibus inter genua & caput vtrinq; insertis. Deinde vultus & os in genua ita obuersa inclinatur, vt nasus quidem inter genua dependere, oculi autem, uterq; alteri genuum propemodum impressi videantur. Quæ cum ita sint, totus quidẽ partus ad interiora uteri aspiciens, & tantum non supinus recubans, formam Sphæræ, in se reflexus, & incuruatus, habitu suo exhibet. Porro circumstant

dant atq; muniunt partum, tres tanquam folliculi, quorum primus reliquos duos, ipsumq; partum inuoluit, defenditq; à malis humoribus, quæ post cōceptum ut superflui & inutiles ex Menstruis restitere, qui neq; ad alimenta partus, neq; ad incrementum aliquid conferunt, sed inutiles atq; ociosi herēt inter Secundinam (ita enim primū hoc inuolucrū vocant) & locos quos vulgo matricem dicūt, donec partus egeratur. Tunc enim inter pariendum vnā cum partu et Secundina, hi quoq; pellūtur, et expurgantur. Atq; hanc Secundinam necesse est, ut partus egeratur, ab obstetrice dissolui, perinde ut in sequentibus trademus.

Proximum folliculum, vulgo Biles vocāt, hoc inferiora partus, ab vmbilico usq; integuntur. Estq; varijs ac multis rugis impeditus, & velut interseptus. Quem ideo summus ille parens lacinosū ita & receptibus densū reddidit, quo, quicquid acerbi humoris, vt sunt lotium, sudor, et id genus alijs, circa partū, colligitur, id omne innocuum vt esset, neue ad partum penetrando, ipsum exulceraret.

Secundo hoc inuolucro ceu quadam deriuatione aliorum diduceretur. Etenim quamdiu in vtero partus est, lotium emittit, non per debita membra, sed per venam, quæ de vmbilico ad id prominet, vt humores illos in secundi folliculi riuos, & lacunas deiciat.

Tertium uero inuolucrum atq; intimū, rursum hoc totum quidem partum inuoluit, actuetur aduersus sui ipsius lotium & humores, & non duritiem secundinæ distinet, ne quid ea durius aut violentius partui impressa, nocere possit. Et hoc vt Alber- tus ait, ab obstetricibus, armatura concep- tus, ab Auicenna autē Abgas appellatur.

Atq; hæc de habitu atq; inuolucris par- tu tradidisse hoc loco, satis vt puto fuerit.

QVOD TEMPVS PARIENDI, ET  
qui partus naturales, & qui contra naturā fiunt.

CAP. II.

Post

**P**ostquam igitur tempus pariendi appetit, id quod fere post nonū mensem fit, hebdomadis à conceptu circa quadraginta exactis, hæc plerumq; pregnantibus signa accidunt, ex quibus pariendi laborē instare cognoscunt.

Principio dolores quidam circa ilia et inferiora vmbilici, & ex aduerso intergo oriuntur. Deinde fœmora & quæ proxima genitalibus sunt, iisdem doloribus grauantur. Mox inflammari incipit, postremo eadem intumescit, humoribusq; exundat, ut facile eius rei significationem prægnanti, de se relinquat.

Quæ quidem signa posteaquam prægnantibus eueniunt, & quæ genitalibus proxima sunt, protinus intumescunt, ipsum pariendi tempus adesse, sciendum est.

Duplices autem partus sunt, quidam secundū naturam, quidā contra dicuntur, Qui secundum naturam sunt, suo ac legitimo tempore, deinde iusto ac debito modo egeruntur.



**Legitimum enim tempus nonus, ut plurimum, mensis est. Tamen si nonnunquam fit, ut septimo mense quædam pariant, & partus ipsædem vitales sint.**

**Octauo uero mense si quæ gignantur, ut hoc quoque interdum fieri videmus, eorum vita aut nulla, aut perquam brevis est, ut Auienna quoque testatur.**

**Modus autem qui naturali partui proprius est, eiusmodi esse debet, ut, quem admodum Albertus Magnus tradit, partus in hunc modum egeratur.**

**Primum, ut caput præcedat, sequatur ceruix & humeri, manus autem lateribus applicatæ, et recta in pedes usque extente, cum ipsædem ultimo edantur. Tum autem facies atque oculi infantis aduersa, ac totus ueluti supinus, ac ore in cœlum aspiciente nasci debet, cuius rei exemplum proxima Figura exhibet.**

**proxima Figura  
exhibet.**

**Nam**





Nam ut Albertus tradit, et à nobis ante  
quoq; memoratum est, partus in vtero ita  
se habet ut antequam pariendi tempus ad  
uenit, ad interiora vteri conuerso vultu se  
deat, suoq; pectore tergū matris aspiciat.  
At uero vbi iam in lucē edendus est, tem-  
pusq; pariēdi adest, resupinus inuertitur,  
ita vt capite terram versus statuto, pedi-  
busq; in sublime erectis, iam non amplius  
tergū matris, sed partem qua exiturus est,

aspiciat, ex quo deinde fit, vt vultu atq;  
ore supino, ut diximus, cum secundum na-  
turam progreditur, egeri debeat.

Alterum autē quod ad naturalem mo-  
dum pariendi attinet, hoc est, ut in exitu  
partus longius non moretur, aut subsistat,  
sed statim ac facile & ceu vno quodam im-  
petu, egeratur.



Partus

Partus vero contra naturam fiunt, si qui-  
cunque uel eo tempore quo non debent, uel  
modo alio quam quo diximus editur. Aui-  
cenna tamē eos partus qui pedibus primo  
egeruntur, manibus in aduersos pedes, ea  
parte, qua iidem pinguiiores esse solēt, mu-  
sculicq; dicuntur, extentis ut in hac figura  
apparet, non naturales quidem appellat,  
sed tamen naturalibus proximos, propte-  
rea quod non adeo periculosi, atq; cæteri,  
qui contra naturam fiunt, soleant esse.

DE FACILI PARTU ET DIFFICILI,  
et quo pacto facilitas aut difficultas hæc cognosci  
potest. CAP. III.

**A**Tque hoc loco sciendum est, quod se-  
penumero varię difficultates ac peri-  
cula circa parientes incidunt, cuius rei cau-  
sas ordine prosequamur. Primo quoties  
matrix angustior est, & mulier ante duode-  
cimū annū concepit, id quod aliquando sed  
tamen raro contingit. Deinde ubi matricis  
os siue exitus naturali aliqua ratione acce-  
dente, aliquo morbo, ut sunt Apostemata,

exulcerationes, ulcera, mariscę, et id genus alia, coartatur, siquidem ex his causis fit interdum, vt matrix nisi cum summo dolore aperiri, partumq; dimittere non possit.

Tertio cum accidunt vesicę Apostemata et intestinis vlcera, aliaq; his similia, cui matrix compatitur, non potest facilem partui exitum præbere.

Quarto, quod interdū circa posteriora eueniunt vlcera, fissurę, ac tumores Hemorrhoidum venarum, siue obstricta aluius, ex quibus fit, vt mulier coniti facile nequeat, & ita matrix certo suo officio destituitur.

Quinto, si mulier imbecillior paulo est, aut complexionis inualide, si natura frigida, si adolescētior, si grandior, si pinguior, aut contra nimis gracilentia, si nunquā antea peperit, si formidulosa, aut morosa nimis est. Ex his enim causis euenit, vt intrastabilis eadē fiat, ac mobilis, nunc huc, nūc illuc discurrat, quę res partū difficilē utiq; & asperum efficit.

Sexto, tanquam generale hoc sciēdum est, mares facilius semper, q̄ foeminas pari.

Septi

Septimo ægrum atq; difficilem partum  
illud quoq; facit, si quod interim sit, partus  
maturior, aut plenior est, quã ut facile clau-  
stra locorum transire possit, aut contra si  
lenior & tenuior est, vt ex eo minus aut tar-  
dius se conuertat, parumq; enitendo cedat.



VIII. Si geminos pariat mulier, aut alioqui partus ipse monstrificus est, ut cum unū corpus duobus capitibus, nasci cōtingit, quale fuit quod superioribus annis in ditione vuerdenberga, hac (quā ad pictam uides) formā, natū est. Aut contrā si partus lænis aut lubricus est, ita ut inter enitendum citius, quā opus sit elabatur.

IX. Quoties non suo modo, atque legitime partus egeritur, ut cum ambobus pedibus aut genibus simul, aut altero pede tantum emergit, aut cum primo pedibus profertur, manibus in sublime erectis, & quod omnium periculosiss. est, quoties aut latus, aut tergū, aut podex inter claustra apparent, reliquis, quę prima conueniebat edī, intus cessantibus. Item cum nascentibus geminis, ambo pedibus, aut alterum pedibus, alterum capite simul prodeunt. Cuiusmodi periculosi modi varie ac multi accidere possunt.

X. Aggrauatur partus, quoties abortus quarto aut quinto post conceptum mense cōtingit, eo enim tempore claustra  
ad

adhuc firma inter se atque ualide constrin-  
guntur, ut Galenus ait. Aut rursus, quoties  
partus in undecimum mensem usq; , prop-  
ter suam ipsius, aut matris aduersam uale-  
tudinem, protrahitur.

XI. Periculose parit quæ partum in  
utero emortuum gerit, propterea quòd is  
neque uerti facile neque moueri ad exitū  
potest, aut cum partus in utero non mor-  
tuis sed imbecillior tamen est, et ægrotus,  
ut ipse exitum suum promouere, aut adiu-  
uare non possit. Quod ex his signis facile  
animaduertitur, si pregnans longo tempo-  
re ualetudinaria fuit, si fluxu uentris, aut  
mensium diuturno atque insolito post con-  
ceptionem laborarit.

Item si à primo conceptionis mense sta-  
tim mammillæ expressæ lac emiserint.

Præterea si partus in utero, suo tempo-  
re non mouetur. Nam emortui in utero  
partus signa, & quo modo ijdem pellendi  
sunt, infra capite nono docebimus.

xij. Periculose paritur, qñ secundina fir-  
mior est, nec facile rumpitur atque exitū  
partui præbet, aut contrà cū eadē mollior

atq̃ tenerior est, anteaq̃ rumpitur, quàm  
partus conuertitur, aut ad egerendum ap-  
tusest. Tunc enim collecti circa illam hu-  
mores, citius abeunt, quàm tempus parien-  
di postulat, partuiq̃ sua & iusta humidi-  
tas atq̃ lubricitas quibus adiuuari debebat  
subtrahitur.

XIII. Impeditur partus nimio frigo-  
re, nimioq̃ calore. Quando videlicet præ-  
gnans nimio gelu et siccitate aëris constri-  
gitur, claustraq̃ locorum ex eo coarctan-  
tur, quę plerumq̃ accidere solēt, ventis ge-  
lidis atq̃ siccis spirantibus. Aut vicissim quā-  
do prægnans nimio estu laborat, is enim et  
matrem & partum debilitat, atq̃ ita ener-  
uat, ut neq̃ hic mouere se, neq̃ illa ad pari-  
endum recte eniti possit.

XIIII. Difficilem partū illa quoq̃  
reddunt, si prægnans consuevit vesci ijs re-  
bus quę exiccant atq̃ constringūt, qualia  
sunt mespila, castaneę, sorbæ, accatię, mi-  
lium, oriza, vitrum nigrum, constringens.

XV. Si prægnans post quintū à con-  
ceptu mensē balneis vtatur frigidis, aut  
ijs quę alumine, vel ferro, vel sale tempera-  
ta



ta fuerint, aut etiam in quibus ea quæ constringunt atq; coarctant, cocta aut macerata sunt qualia sunt glandes, cortex ex queru, glandium caliculi, gallæ, granatorum cortex, quæ et psida, dracontiū, pentaphyllum, tormentilla, rosæ, mespila, pyra syluestris, poma matiana, lapides vsti, & his similia.

XVI. Si prægnans moesta plerumq; fuit, aut valetudinaria, si fame atq; siti affecta, nimiaq; insomnia exhausta sit.

XVII. Si prægnans partu appetente, grauiter olentibus vsa sit. Attrahunt enim illa matricem, quæ quo magis attrahitur, eo plus partus impeditur.

XVIII. Si prægnans doloribus afficitur, qui non ad inferiora vteri descendunt, sed supra vmbilicū herent, aut retro intergum residunt.

XIX. Si priores partus quoq; cum difficultate atq; negotio multo egesti fuerint, neq; enim tunc posteriores faciliores erunt, quippe consuetudine iam firmata grauitate.

At contra signa facilis & expediti par-

tus sunt, quęcūque superioribus contraria atq; diuersa sunt, ut cum pregnans priores quoque partus facile ac sine magno negotio egeffit, cumque pariendī tempore modicis ac lenibns doloribus, uexatur, aut si magnis uexetur, illi tamen non resistent in superioribus, sed ad genitales partes descendunt.

Porro in partu difficili signa, quę securitatem atque felicitatem parienti promittunt, hæc sunt, inquietudo, & agitatio partus in utero, & cum dolores semper ad inferiora, antrorsum uersus recurrunt, præterea cum pariēs ualida est, neque difficulter anhelatur, recteque & fortiter eniti potest. Mala uero hæc portendunt, quoties pariēs frigidū desudat, et uenarū pulsus cōcitior est, ipsaq; inter laborandū deficit. Hęc enim præsentaneę mortis indicia sunt.

Q. V I D P A R I E N T I B V S M A X I M E  
agendum, & quomodo ægre parientibus subueni-  
dum sit.

CAP. IIII.

**P**Roinde qui subuenire uolent partibus difficilibus atq; ægris, de quibus proximo capite diximus, eos necesse erit.

et

ea quæ deinceps trademus obseruare. At  
primo quidem prægnantem oportet, du-  
plici diæta uti, altera per mensem proximū  
ante partum, altera in ipso partu, hoc mo-  
do. Principio omnia ea uitanda illi, fugien-  
daq; sunt, quæ partū impediunt, si modo  
illa uitari poterunt. Nam si qua uitari om-  
nino nō possunt, ut quæ uicia natura aut  
alia quauis causâ inoleuerūt, istum reme-  
dium aliqua adhibenda sūt, quibus quan-  
tum fieri potest, leniora, aut minus noxia  
reddantur. At uero si quod periculum ex  
matrice, aut genitalibus, aut exulcerationi-  
bus, alijsq; id genus uicijs, quibus claustrā  
locorum contrahuntur, exitusque partus  
impediūtur, incidat, medicandum illi erit,  
antequam tempus pariēdi appetat, & chi-  
rurgi adhibendi qui eo uicio prægnantem  
quantum fieri potest, subleuent. Eodem  
pacto si qua uesicæ aliquo morbo laboret,  
ceu sūt, calculus, exulceratiōes, strāguria,  
aut si qua ex ficibus, inflationibus, aposte-  
matibus, male affecta foret, curandum est,  
ut medicina per tempus illi admoveatur.

Item si prægnans ita constipata foret,

B iiij

vt facile aluum purgare non posset, & adu-  
sta materia penes illam remaneret, debet il-  
la proximo ante partum mēse, ijs rebus ve-  
sci, quę leniunt atq; dissoluūt. Qualia sunt  
poma cum saccharo frixa, si ea ieiuna, ac ma-  
ne absorbeat, ac deinde ciathum vini meri  
aut cum succo malorum dulcium tempera-  
ti, ebibat, aut si mane ac vesp̄i ficos edat.  
Rursus eadem hæc abstinere debet ijs quę  
consolidant atq; restringunt, qualia sunt,  
quę torrentur, aut assantur, præterea ori-  
zum, oua dura, milium & his consimilia.  
Quod si necessitas amplius poscat, potest  
eadē vti clystere, leni tamen, & iure ex pul-  
lo aut elixa carne, temperato. Potest item  
medicamento aliquo leni uti, quod demul-  
ceat, atq; molle faciat.

Item suppositoria ad mouere licet de sa-  
pone & larido vel vitellis ouorum tempe-  
rata. Quod si prægnās appropinquat e par-  
tu, debilis ac languida fuerit, confirmari ea  
debet cibo, potu, & electuarijs nobilibus.  
Atq; ab eo quidem tempore, prægnanti  
omnia facienda, quę illam ad pariendum  
aptam, idoneam atq; sufficiētem reddant.

Omnia

Omniaq; ea adhibere illa debet, quæ uel  
laxant, uel leniunt, uel molle faciunt, uideli  
cet ut genitalia ipsius relaxentur ac specio  
sa fiant, facilemq; exitū partui præbeant,  
idq; præcipue in adoleſcētioribus fieri de  
cet. Nam grandiores quæ sunt, in ijs genita  
lia, atq; vuluæ, duriora siccioraq; sunt, ob  
quam causſam hæc uti debent calidis atq;  
humidis, quæ lene atq; lubricum reddant,  
quæ uel ore ſumūtur, uel infra genitalibus  
locis ſupponuntur, uel extra fomentum  
aut unguentorum modo adhibentur, quale  
fuerit pingue ius, ex carne elixa, aut pullo  
ſaginato, aut capo. Genitalibus autem ad  
hiberi debent hæc, adeps gallinacius, ana  
tum, atq; anſerum, præterea oleum, quod  
cūq; mollificat, viſcoſitas granorum cido  
nei, ſeminis lini, Ibiſci, ſeni græci. Potu au  
tem uti prægnantem decet, uino beneco  
cto, eoq; aqua mixto, inſuper uiſtus ratio  
nem habere debet, ut ijs potiſſ. veſcatur,  
quæ humectent, non autem pingueſciant,  
contra illa uitet, quæ exiccant, aſtringunt,  
contrahunt, atq; coarctant, & hæc proxi  
mo ante partum menſe. Sub partum autē,

quando uidelicet dies circa decem aut non  
multo amplius super sunt, et quę pregnant  
est, difficultatis aut doloris non nihil sentis-  
cit, debet ea quotidie calidis aquis lauari, &  
id sepius quàm longius, ne nimis ex eare  
languescat. Atque ibi paulo ultra umbilicū  
mergi debet, ita tamē aqua temperata, ut in  
ea sint quę lene ac molle reddunt, ceu sunt  
maluæ, Ibisus, Camomilla, mercurialis,  
capillus ueneris, semen lini, semen feni gre-  
ci, & id genus alia. Quod si ex imbecillita-  
te corporis, calidas aquas ferre non possit,  
spōgia tum, aut panno aliquo, aqua illa ma-  
defacto, pedes, item genitalia & claustra il-  
lorū & lumbos abluere, non inutile fuerit,  
iisdem autem temporibus hypocaustorū  
balneis, ac publicis abstinere debet quòd ea  
tunc debilitare atque languidas facere sole-  
ant.

Ceterum ubi ad hunc modum, se laue-  
rit, tum demum pinguedines eas, quas su-  
pra commemorauimus adhiberi conuenit  
iisque ipsis, aut pingui aliqua medulla, ter-  
gum, ilia, umbilicus, latera, & quę proxima  
genitalibus sunt, defricari, ungiq; debent.

Præ-

Præterea è re prægnantis fuerit, supradi-  
ctas pinguedines ipsis genitalibus infundi,  
Ac illam quidem ipsam, supinam atque in  
dorsum iacētem, mediumque corpus pau-  
lum in sublime iactātem, quo infusa facili-  
us introrsum recipiantur, spongia uel lana  
uel sacculo clysterico, pingnia atque ungē-  
ta illa quæ diximus instillare. Et hoc preci-  
pue, si matrix arida atq; sicca, aut ipsa præ-  
gnās corpore macro atq; gracilēto fuerit.

Proderit autem & suffire genitalibus  
musco, scilicet, ambra, galliamuscata, quæ  
prunis imposita gratū ac sua uem odorem  
præbent, quo & loci ipsi aperiuntur, & in-  
fra uorsum attrahuntur.

Et, quod supra quoque monuimus, uic-  
tus rationem in primis habere prægnan-  
tē decet, ut nō uescatur, quæ uegetent atq;  
confirmēt, melioribusq; semper quā  
pluribus uescatur, uino autem suauī ac be-  
ne sapiente utatur, præterea mediocriter  
corpus exerceat, agendo, mouendo, eun-  
do, ac stando aliquanto plus quā ali-  
oquī consueuit. Hæc enim partum



promouent, & ad egerendum adiuuant.


Atq; hæc quidem dietæ eius descriptio est, quâ ante partum mense proximo aut longius, prægnantibus obseruandam esse diximus. Altera est, quam sub ipsum pariendi tempus necessariam esse ducimus, cum prægnans doloribus grauari, & humores qui hætenus circum locos collecti steterant, ad genitalia profluere incipiunt. Atq; huius quidem ratio duabus partibus continetur. Primo vt quæ facilem partus reclinationem atq; exitum reddunt, procurentur. Deinde vt accidentibus doloribus atq; laboribus subueniatur. Atq; huc quidem pertinet, vt prægnans aliquantisper, ad horam scilicet, aut circâ resideat, deinde resurgens scalas sursum deorsum itando atq; alte clamando, sese agitet. Præterea conuenit aliquantisper anhelitum quoq; retinere & cohibere, quod ea re intestina coguntur atq; deprimuntur. Nec non & medicina eam quam infra describemus, sumere prodest, ea siquidem partum impellit, & ad egerendum promouet.

Cæterum ubi iam prægnās, matricē la-

xari



xari, atq; dissolui, humoresq; largius manare sentit, tum demum reclinari aut resupinari debet, ita ut neq; stare iam, neq; prorsum iacere videatur, ipsumq; caput resupinum pendentis formam magis, quam iacentis præbeat. At quam quidem rem, in quibusdā regionibus, ut in Gallia et Germania superiori, obstetrices peculiaria sedilia habent, quæ & ab humo non altè distant, & excaviata ita sunt, ut facile, quæ debent, transmittant, & reclinantem tergo accipiant, quarum forma ferè est talis qualem hic adpinximus.



Itaq; cum partus iam instat, debent ea  
sedilia à tergo pannis atq; lacinijs expleri,  
& densari, quę obstetrix, reclinata iam pa-  
riente, nunc in dexteram, nunc in sinistrā  
uersabit. Ipsa uero obstetrix ante pręgnā-  
tem sedeat, diligenterq; obseruet quantū  
ac quatenus se partus moueat. Deinde  
membra pręgnantis ac uterum manibus  
suis, oleo tamē ante amigdalino, aut quod  
lilio albo temperatū est, perunctis, regat,  
& qua commodiss. erit, ueluti gubernet.

Parentem quoq; obstetrix docere atq;  
confirmare debet, nec cibo potuq; recrea-  
re modo, sed etiam uerbis consolari, bonā  
spem partus foelicis, aut masculi, eo enim  
gaudent ferē mulieres, promittere. Iube-  
re autem ut animam quantum potest re-  
primat atq; cōtineat, ac deinde uteri quod  
supra umbilicum est, id molliter manibus  
comprimere, & urgere, id enim partū ad  
inferiora depellit.

At uero si pariens pinguior foret, aut  
carnosior, conuenit eam potius inclinātā  
iacere quā sedere, ita ut frōte humum  
contingat, pedibus in se retractis atq; re-  
curua

curuatis, quo uidelicet eo pacto matrix urgeatur impellaturq̃. Deinde ipsa genitalia conuenit, oleo candidi lilij intus perungi. & si necessitas poscat, non uereatur obstetrix ipsa illa manibus cōtingere & claustra parientis relaxare, id enim ad celeritatem rei maxime pertinet.

Cæterum hoc cauere debet obstetrix, ne ad labores adigat parientem prius, quàm partus se exhibeat atq̃ uidendum se præbeat. Antea enim quàm hæc fiunt, irritus labor est, qui à connitente suscipitur. Et parientes labore conficiuntur, ut cum postea laborandum fuerit, sufficere labori amplius nequeant.

Porro ubi iam in labore pariens erit, & iam Secundina, in qua partus inuolutus est, in foribus apparet, sciendum est partum ipsum appropinquare. Itaq̃ si ipsa secundina sponte sua rumpi cesset ac neget, obstetricis erit, illam unguibus leniter in fricare & p̃scindere, aut si hoc cōmode nō possit, apprehensā inter digitos, forpice aut

culcello leniter incidere, ita tamen, nequid  
eo vuluere partum perstringat. Quo fa-  
cto profluuium humorum, de quibus ante  
dictum est, fiet, & ipse partus protinus cō-  
sequetur.

At uero si quo casu accideret, vt secun-  
dina prius ab obstetrice incisa, et aquarum  
profluuium exhaustum omne foret, quàm  
tempus & res postularent, ita vt genitalia  
parientis exiccata iam essent, ipseq; partus  
nondum planè ad fores, & exitum reclina-  
set sese, moramq; res aliquam factura vi-  
deretur, tunc necesse erit, oleum Lilij candi-  
di, aut pinguedinem liquatam, eaq; leniter  
tepefacta genitalibus parientis infundi, quæ  
exitum lenem atq; lubricum reddant. Præ-  
cipue tamen in his difficultatibus prode-  
rit, albumen ouis vnà cum vitello, genitali-  
bus infusum. Dādaq; opera vt quæ sternu-  
tationē prouocent, parienti adhibeantur.

Quòd si partus ipse grandior foret, aut  
ipsum caput partus in foribus hereret, ob-  
stetrici conuenit, claustra matricis relaxa-  
re, & molliter manu admota, eaq; oleo seu  
pinguedine, quarum antea mentionem fe-  
cimus

emus peruncta, dilatare. Similiter, si femi  
na uel gemelli partus forent, cum oleo pro  
ut supra monuimus, agendū est. Atq; hæc  
omnia de partu naturali dicta uolumus, ui  
delicet, cum caput à principio, & deinceps  
reliqua membra sequentur, ut supra cap.  
tertio traditum à nobis est, & hic iterum in  
hac imagine cernerelicet.




At uero ubi partus contra naturam egerit, quale fit, si pedes priores egerantur, manibus in musculos pedum demissis, ut in hac figura cernere est.




Ibi tamen necesse erit obstetricem omnem operam atque curam adhibere, si possit ungendo atque demulcendo brachia manuumque partus, regere atque ita gubernare, & immotis illis manentibus una cum pedibus molliter prodant.

Quā

Quamq̃ multo satius foret, si qua fieri posset, ut obstetrix huiusmodi primo prodeūtes pedes, sursum uersus, iterum remoueret, quo uidelicet ipsi pedes ad umbilicum usque retro ascenderent, caputque secundum tergum parientis inclinatum, denuo cōuerteretur, tum enim sine periculo parit ac naturaliter denuo ut superiores, egeri posset. Rursum cum partus hoc modo progreditur, ut pedes ambo priores quidem exeundo sint, manus autem non ut supra, pedum musculis applicatae, sed in sublime erectae fuerint, tum obstetricem oportet operā nauare, ut manus



si quæ possit, reducat, et in locum debitum redigat, præcipue autem hoc elaboret, ut totum partum conuertat in hunc modum quo hic depictum uides. Quòd si hoc non potest, excipiendi quidem pedes erūt, manus autem in locū, & ad latera, quā aptiss. id fieri potest, redigendę. Quòd si neq; hoc potest, tum demum pedes ipsi, ut n̄ quidē priores exerunt se, lineo aliquo uinculo colligari debent, atq; ita pedetentim, & quā molliss. potest, totus partus ab obstetrice, extrahi & ad exitū deduci debet. Neq; uero periculosior pariendi modus hoc ullus aliusest.





Fit autem interdum, cum partus in pedes procidit, ut alterum tantum pedem egerat, altero intus retento, ut ex præsentifigura patet. Quod ubi accidit parietem decet in tergum resupinari, ita ut pedibus sublimatis & aluo, caput reclinatum dependeat. Eoque facto, obstetricem convenit, pedem eum qui processerat, quam mollissimè introrsum denuo, manu subigere, & recōdere, deinde ipsam parentem monere ut aliquoties se huc atque illuc revolet, donec partus legitime cōvertatur, caputq; foribus obuertat. Atque tum demum in solium revocare, ac recipere, eaque quæ ad egerendum partum pertinent, persequi. Quod si vero contingat, ut partus in utero, quamvis volutante se matre, converti denuo, ac iusto modo nolit; tum obstetricem oportet, etiam alterum pedem, qui intus cessabat, ad exitum adducere, & in ordinem revocare, partumque ita in pedes excipere, hoc tum ubique observato, ut manus in pedum musculis demissæ non disturbentur.



Rursum si partus in latus procideret, operam dare obstetricem decet, quo in pristinum locum atq; habitum illum reducat, ac deinde ad legitimam conuersionem, exitumq; promoueat.



Aut si contingat ut pedibus diuiliis aut  
distortis, quale est quod in præsentī figu-  
ra depingitur, partus progrediatur, cur-  
dum itidem est, ut pedes in unum reuocen-  
tur atq; confundantur, ac deinde partus ad  
exitum, catione tamen ubiq; circa manus  
illa quam diximus, obseruata, deducatur.



Quod si fiat ut genibus ambobus aut altero tantum partus se ostendat, obstetricis erit, partum submouere eò usq; dum in pedes procidat, & ita reliqua deinceps, ut supra emouere.



Rursum si altera tantum manu se exhibeat partus, ut in hac figura cernitur, non admittendus ultra partus est, sed inserta

inserta manu obstetricem cōuenit, hume-  
ros partus comprehēsos sursum uersus re-  
mouere, donec receptam intro manum la-  
teri applicare possit; ac deinde caput, ad ex-  
itum promouere. Quòd si hoc loco, manus  
intro reuocata, lateri ut debet, applicari  
nō possit, redeundum ad illam superiorem  
formā est, ut parientis corpus reclinetur,  
uterusq; in sublime efferatur eo usq; , dum  
partus retro labatur, eoq; ita relapso, tum  
demum ad solium illa referatur, ac pariat.



Si partus in manus procidat ambas, ut  
in hac figura apparet, obstetricem decet  
humeris apprehensis partum eousq; intro  
remouere dum manus lateribus applicet,  
ac deinde suo modo ad egerēdū remittere.



Si uero in podicem partus prouoluatur  
eoq; pacto in foribus appareat. Debet ob-  
stetrix inserere manus ac partum submo-  
uere, donec in pedes procidat, atq; ita dein-  
de exeuntem excipere. Quanquam satius  
multo esset, si fieri posset, hoc loco ita par-  
tū submouere ut non in pedes, sed in caput  
conuerteretur, naturaliq; modo egereretur.  
Item



Item, si partus inflexa ceruice exhiberet  
se, ut hic depingi uides, necesse erit retro  
submouere humeros, & leniter caput suo  
loco restituere. Hoc secus agendum est, si  
forte in pectus procideret partus, aut auer  
so uultu exitum peteret.




Item si partus ita procideret, ut simul pedibus ac manibus sese deijceret, quale in figura præsentī uidere est, tamen obstetricē decet apprehenso capite, pedes in sublime reuocare, & ita ad exitum deducere.





Contra si in pectus procideret partus retē-  
tis simul ac discriminatis intus pedibus ac  
manibus quale est quod hic depingitur, ta-  
men insertis molliter digitis, in latere pari-  
entis per obstetricem, partus inuertendus  
est. Quod si totam manum inserere possit,  
tum ita gubernandus & redigendus par-  
tuserit, ut quæ pars, foribus prior, &  
ad egerendū aptior fuerit, ea comprehen-  
sa, ad exitum protrahatur, quanquam, si  
in capite conuerti partus posset, multo id  
tutissimum foret.



Iam si eueniat, ut partus simplex aut  
unus non sit, sed gemini, nōq̃ simul se osten  
dāt. Si id quidem capite, obstetricem oport  
et alterum post alterū, ita tamen ut poste  
riorem e manibus non emittat, et priorem  
ut est, conseruet, deducere,



At uero si non capite, sed pedibus priores exeant, rursus ea danda opera est ut alterum post alterum, sed quam commodissime excipiat, eo pacto quo supra in simplicibus, docuimus.



Quod si diuerso modo ad exitum tendant, ita ut alter capite, alter pedibus se exhibeant, elaborandum pari studio obstetrici erit, ut qui prior ex his fuerit, eum prius educat, qui posterior posterior, ita tamen ut neuter alterum inter exeundum allidat seu atterat. Quanquam si, qui posterior exit, & in pedes procidat, conuerti denuo possit, ut caput foribus obuertatur, id ualde utile foret ac tutum.

Proinde obstetricem decet, subinde genitalia parientis, tepesfacto oleo, aut uiscositate aliqua, puta fenigræci seminis, aut seminis lini, aut maluæ sublinere atque fouere, ut & partus faciliorem ac leniorem exitum inueniat, & mater ipsa minore ærumna atque dolore pariat. Et si qua forte contingat, ut parientis genitalia uel loci, Apostemate aut ulcere aliquo præmantur, idque uicium ob propinquitatem partus, leuari, aut sanari non potuerit, debent ea genitalia, siue loci, oleo, adipe, aliisque unguentis quæ leue ac lubricum faciunt, perfundi, uiciatque ipsa quantum pro tempore fieri potest, leniri, atque permulceri, id quod supra quo

que monuimus, ipsa que parturiens in faciem procumbere debet, quemadmodum pinguis & carnosissima illa, de qua supra à nobis dictum est.

REMEDIA QUAE PARTVM AD-  
*iuuant, ac facilem reddunt.*

Cap. V.

Væ partū adiuuāt, ac faciliore reddunt, hæc sunt: principio parētem necesse est uel reclinatam sedere, uel supinam in tergū iacere, ut nos supra docuimus, & ut cuiusque usus aut consuetudo feret. Deinde per hyemen & frigus, locus ubi pariens erit, calefaciendus est, per æstatem autem, uentus admittendus & refrigerandus idem est, ne inter æstū atque laborem pariens deficiat. Præterea sternutatio excitanda pariēti est, et ea uel helleboro, uel pipere in puluerem redacta, reclinarique eadem debet, uel in scamnū, uel in solū, ut de ea re capite quarto supra dictū est. Debet quoque latera parturientis premi, & cōstringi, & ceu infra uersum, de trudi.

Obstetrix autem, ipsa quidem sedulo agat, neque quicquā remittat temporis, aut

D

laboris, genitalia atq; matricem parientis  
oleo atq; alia pinguedine linendo atq; in-  
ungendo, in hunc uidelicet modum. Ac-  
cipe pinguedinem anatis, aut oleum de li-  
lio candido, croci duo grana, musci granū  
unum, eaq; ritē inter se temperato. Eoq;  
unguento genitalia parientis oblinito.

Quod si hoc remedio nihil profectum  
erit, suffitu medicandum erit parienti hoc  
modo.

Accipe Myrrham, Galbanum, Casto-  
reum, eaq; in pilulas contusa cum felle bo-  
uino redigito, & ex pilulis, quantum dra-  
gma una pendeat, carbonibus imponi-  
to, eoq; odore, qui inde fit, locos muliebres  
suffito, aut aliter, hoc modo.

Accipe Sulphuris citrini, Myrrhæ, ru-  
beæ tinctorum, Galbani, oppoponaci, sin-  
gulorum par pondus, ijsq; in pilulas reda-  
ctis atq; temperatis, genitalia parientis suf-  
fito.

Item suffitus ex stercore columbi, aut  
aliu ex stercore Accipitris, addito oppo-  
ponaco eodem modo prodest.

Vtile

Vtile quoque est lanam Succo Rutæ  
intinctam et madefactam genitalibus par-  
rientis inseruisse, aut rursus, lanæ imposi-  
tum puluerem Aristologiæ rotundæ, aut  
radicem quam uocamus Bothor Marte,  
siue malum terre, aut semen Staphisagrie,  
hæc singula inuoluta lanæ, ac genitalibus  
immissa partum prouocant,

Item accipe helleborum, & oppopona  
cum, eaq̃ lanæ simul inuoluta, genitalibus  
insere, inserta enim aut partum uiuum aut  
emortuum prouocabunt atq̃ protrahēt.

Item cortex cassiæ fistulæ contritus &  
temperatus iure ciceris, aut cicerculæ, aut  
sicæ non sint, uino haustus, partum adiu-  
uat.

Item Asa fetida magnitudine ac ponde-  
re cicerculæ, unâ cum castorio, ponderis  
auellanae aut draginae pondere, contrita et  
iure cicerculæ uel uino aqua mixto, tem-  
perata atque hausta, partum promouet.

Promouet item Cinnamomum cum iu-  
re cicerculæ, aut uino haustum.

Item accipe scrupū rosarū cū aqua ex le-  
mine feni græci, cicercula, capillo ueneris,  
ij̄sque cōtritis, decocta, et oleo puniceī lilij,  
nō ita multo, temperatū, parientiꝝ sorben-  
dum præbeto, & promouebit partū. Simi-  
liter promouebūt Aza foetida, & cassia li-  
gnea, ex uino epotæ. Item Ibiscus aqua de-  
coctus, potionem parientibus utilem præ-  
bet. Nec inutile erit parturientes ea aqua  
lauari, in qua ibiscus decoctus fuerit.

PILVLAE QVAE PARTVM FACI-  
*lem reddunt, ac promouent.*

Accipe Cinamomi & Sabinæ, utriusq;  
pondo duarum dragmarum, præterea cas-  
siæ lignæ, dragmam unam cū dimidia,  
mirrhæ, aristolochiæ rotūdæ, costi amari,  
utriusq; dragmam unam, storacis liquidæ  
dragmam dimidiam, & oppij pondere xij  
grana, eaꝝ in pilulas redacta pondere .ij.  
dragma, duabus uncij̄s uini ueteris, epotan-  
da parienti dato.

Item crocum & siler montanum, om-  
nibus animantibus partum promouent, si  
absorbenda data fuerint. Sed tamen mulie-  
ribus non ultra dragmam unam croci dan-  
dum



dū est, amplius enim datū noceret. Itē acci-  
pe sabine quinq; drachmas, rutæ drachmā  
cum dimidia, grana Iuniperi 2 drach. Asæ  
fetidæ, Ammoniāci, rubeæ tinctorum, sin-  
gulorum pondo. 2. drachmarum, & ex ijs  
conficiantur pilulæ, quæ parientibus datæ  
cum aqua, in qua sabina, pulegiumq; cocta  
fuerint, aut cū iure cicerculæ & succo Ru-  
tæ, partumq; inuabunt.

Item accipe sabine. ij. drach. Asæ foeti-  
dæ, armoniāci, tinctorū rubeæ, singulorū  
drach. dimidia, eaq; in pilulas redigito, pa-  
rientiq; ij. drach. ex uino haurienda dato.

Item accipe Aristolochiæ lōge, piperis, et  
Myrrhæ, singulorū pōdusequale, ijsq; uino  
temperatis & in pilulas redactis, ex aquæ  
cū lupino decoctæ, una uncia parienti dato.  
Hæ pilulæ tantæ efficacitæ sunt, ut partum le-  
uent ac facilem reddant, & matricem om-  
nibus, seu uiuis, seu emortuis euacuent.

Item accipe bdellij candidi, myrrhæ &  
Sabinæ pond. paria, ea cum cassia lignea  
& melle in pilulas magnitudine cicerculæ  
temperato, earūq; singulis uicibus quinas  
parienti dato, quæ eiusdem cum superiori

bus efficaciatæ sunt. At quæ sequuntur pilulæ tantę efficaciatę ac potestatis sunt, ut reliquas omnes superent. Accipe Myrrhę Castorei, Storacis, singulorū pon. .i. drachmam ijsque cum melle temperatis, pilulas facito, parientiꝫ cum cyatho uini. .z. drachmas si dederis, ita operabitur, ut uix aliud quicquam.

*EMPLASTrum ad promouendum partum.*

Accipe colocynten, camę aqua decoquito, deinde cum aqua ea, myrrham, succum rutę, & farinę hordeaceę quantum satis erit, subigito atq; temperato, ijsq; omnibus in emplastrı modum redactis, parientis utero, quantum inter umbilicum & genitalia est, illud imponito, adiuuabitq; plurimum.

Quamquam aut multa etiam alia restāt, quę item partum promouent ac iuuant, tamē ceteris ob breuitatem omıssis, ea modo, quę efficaciora magisq; probata uidebantur, huc apposuimus.

*QVOMODO SECVNDINA E PARIENTIBUS EXIMENDA SIT, si ea sponte sua non discessura sit.*

CAP. VI.

Ceterę

**C**Aeterum fit interdū ut secundina q̄  
alias unā cū partu egeritur intus re-  
tenta, partū non comitetur, idq̄ multis ex  
causis accidit. Aut em̄ laboribus atq̄ dolo-  
ribus mater ita cōflictata est, itaq̄ uiribus  
exhausta, ut ultra enitēdo, secundinā ege-  
rere nequeat. Aut quod sæpe fit, in locis il-  
la implicita atq̄ alligata heret, aut humorib̄  
destituta, aquis uidelicet citius aliquā-  
to diffuētibus uia amplius lubricū ac faci-  
lem, qua exeat non habet, aut deniq̄ quod  
loci nimis ac lōgis laboribus lassati, cōtra-  
xere se, aut tumefacti dolore, exitū preclu-  
serūt. Itaq̄ quacūq̄ ex causa secundina re-  
tinetur, dāda modis omnibus opera est ob-  
stetrici, quo illa soluatur, egeraturq̄. Nam  
nisi hoc fiat, grauis atq̄ difficilis egritudo  
parientibus instat, præcipue aut suffocatio  
matricis quā uocāt. Quę ideo præcauenda  
est, quod cū secundina intus retenta m̄ase-  
rit, statim ac facile illa putrescit. Vnde po-  
stea mali uapores ac noxiij sursum ad cor,  
ad cerebrum, & ad Diaphragma ascen-  
dūt, ex quibus deinde puerpera fit asmati-  
ca plerūq̄, crebroq̄ deficit, atq̄ exanimis.

sine pulsu arteriarum iacet, interdum etiā plane suffocatur ac moritur. Proinde nequid huius fiat periculo præuortendū est, omnibusq; modis ac studijs curandū, ne secundina retenta atq; neglecta relinquatur.

Igitur si secundina propter imbecillitatem & languorem parientis retineretur, debet ea cibo ac potu, & alijs eodem pertinentibus rebus refici, ac refocillari, utpote iure, quod sit ex vitellis ouorum, aut uino ueteri, aut carne pingui, aut auibus, aut galinis, aut perdicibus, aut lagopodibus, aut turturibus, aut capis, & id genus alijs.

At si ex angustia & contractione matricis, siue quod eadem tumefacta dolore, ut diximus, fuit, secundina retinetur, tunc utendum ijs remedijs ad prouocandā illam erit, quę lene ac lubricum faciunt, ijsq; ipsa matrix relaxanda atq; amplianda erit. Vt sunt oleum & adeps, & in specie oleum ex lilio candido, oleum amaricinū, oleum ex Narcisso, oleum ex lilio puniceo. Præterea grana Iuniperi, item galbanū cōtritum & ex uino tepefacto haustū. Item eodem modo sumptum Abrotanū, item pulegium  
uino

uino decoctum & haustū, præter hæc pro  
sunt ea quæ lene ac molle faciunt, ut adeps  
gallinæ, adeps anatis, adeps anseris, oleum  
lilij, infusa genitalibus, & illita intus ac fo  
ris, utile quoq; erit suffumigari genitalia  
parientis, & malua, Ibisco, Branca ursina,  
suffiri, item aqua furfure temperata ac cali  
da lauari, aut sacculos furfure oppletos ge  
nitalibus imponi, ijsq; foueri.

Rursum autē si secundina hæreret, ma  
trici implicita siue illigata, ut resolui facile  
non possit, suffitu medicari proderit, uideli  
cet sulphuris, foliorū Hederæ & nasturcij,  
aut nasturcij & ficuum, præterea omnium  
odoriferorum, ut sunt, ambra, muscus, thy  
miana, Gallia muscata, & confectio nere.  
Quibus carbonibus impositis ipsa pariens  
ita suffire se debet, ne quid eorum odorū  
nares eius contingat.

Nā naribus ea admoueri debent, q̄ ma  
le olent, adeoq; foetent, ut sunt Aza foeti  
da, castoreum, capilli hominis cremati, plu  
mæ pauonū crematæ. Item proderit in  
hoc casu, parientem suffiri infra odoribus  
ex ungula asini. Qui tametsi malè olent, ea

tamen natura atq; efficacia sunt ut nō tantum secundinam sed partus quoq; emortui ospellant. Præterea parientem hic oportet animam comprimere, coërcere, & uelut deorsum uersus detrudere, nec non helleboro aut pipere contuso ad sternendum eadem prouocari, naresq; & os comprimere, & obturari eiusdem debent.

Prodest quoq; unguentum quod Basili conuocant ( de quo Mesue distinctione xi. scribit ) matrici infusum.

Mollificat enim & propellit, Secundinamq; ad exitum laceffit. Quæ simul atq; pulsa, et egesta erit, oleum rosæ matrici infundi debet.

Item prodest aqua rosæ, in qua pulvis Ibis inritus erit, epota, promouet enim & facilem uiam secundinæ facit.

Quod si pars aliqua secundinæ in foribus apparet, leniter attrahere illam obstetrix debet, atq; curare, ne abrumpatur. Et si forte metus foret, ut abrumperetur, ea pars quæ ab obstetrice comprehensa est, summo pedi parientis alligari debet, neq; stricte nimis, ne rumpatur, neq; laxè nimis, ne

ne rursum elabatur . Dandaq; opera est  
ut sternutatio parientis, ut supra dictum  
est, prouocetur .

Quod si neq; tunc secundina cedat ac res  
moram aliquanto longiorem trahat, uidē  
dum obstetrici erit, ut neq; nimium attra-  
hendo illam fatiget, neq; rursum tum di-  
mittat, sed pedi parientis ut diximus, aut  
alicui alteri rei alligatam, leniter huc atq;  
illuc moueat, ac ceu labefactet, donec di-  
uelli à matrice incipiat, & cum semel di-  
uelli incipit, leniter in diuersum mouendo  
pergat, donec prorsū à matrice separetur .  
Omninoq; à ualida & uiolenta motatio-  
ne atq; agitatione abstineat, ne unā cum  
secundina & loci emoueantur .

Quod si inter moram hanc crebri ac ni-  
mij dolores parientem corripiant, ita ut  
cōcidat atq; deficiat, preberi ea illi debent,  
quæ capitis dolores læuant, & pectus con-  
firmant, qualia sunt Electuaria, quæ con-  
stant Musco, Ambra, & confectio de  
gemma, seu Diamargariton, & id genus  
alia .

Præ



præterea ea quoq; quæ stomachum confir-  
mant, ut diagalanga, dia Cynamomum, &  
cætera quæ in Myropolijs in hunc usum  
cõficiuntur. Atq; hæc uino macerata epo-  
tari conuenit.

Item, ad emouendam secundinam: acci-  
pe, Rutæ, Marrubij, Abrotani, Arthemii  
sic, singulorum pond. par, & olei ex lilio,  
tantundẽ ita ut herbæ probè macerari atq;  
humectari eo possint, atq; omnia hæc simul  
in ollam uitreatam indito, ollamq; obtura-  
to, eiusmodi tamen operculo, quod in sum-  
mo ac medio foramẽ tale habeat, per quod  
postea fistula inseri possit. Deinde foco im-  
positã hanc efferuescere facito, quæ ubi be-  
ne efferbuerit, à foco remotam, carboni-  
busq; paucis impositam, solio, in quo pari-  
ens residet, postea fistulam, quàm in hunc  
usum faciendam curabis, altera extrema-  
te in foramen operculi, de quo paulo ante  
dictum est, inserito, alteram eiusdem extre-  
mitatem genitalibus pariens suis immitti-  
to, omniãq; circa uelamentis atq; uestibus  
ita munito atq; obstruito, ne qua uapor ex-  
ire possit. Ac deinceps per horam unã atq;  
alteram



alteram suffimine hoc matricē foueat atq̃  
leniat, donec secundina ultrò se soluat atq̃  
emoueat. Quòd si neq̃ suffitu quicquam  
proficiatur, emplastrum inter umbilicum  
& genitalia parienti imponendū eiusmo-  
dierit, quod partus etiā emortuos pellere  
efficax sit, de quo in sequentibus diceretur.

Quod si neq̃ tum secundina cedat, ulte-  
riore cura atq̃ remedio utendum non est.  
Nam quę ita obstinate atq̃ perseueranter  
heret ut supradictis rationibus pelli neque  
at, ea relinquēda est, dum sua spōte postea  
discedat, paucis enim diebus postea com-  
putrescit atq̃ in humorem dissoluitur, &  
modo salsurę aut fecis dilutę, ultrò diffluit.

Quanquam interea odor & uapor hoc  
pacto diffluentis non parum puerperam  
grauat, doloribusq̃ capitis ac cordis,

stomachi quoq̃ imbecillitate

affligit, & cruciat, ut su-

pra quoq̃ comme

morauimus.



VARIIS CASVS, QVI CIRCA, AVT  
etiam post partum mulieribus accidunt, quo pacto  
et quibus remedijs praeuerti, atq; curari debent.

CAP. VII.

Sciendum autem est, quod plerumq;  
post partum, mulieribus accidunt, aut  
febris, aut tumefactio, aut inflatio corpo-  
ris, aut tormina uentris, aut commotio si-  
ue translatio matricis. Atq; horum cau-  
sae plerumq; sunt, imperfecta menstruorū  
expurgatio à partu, aut imbecillitas pari-  
entis, quae fit ex nimio profluuio circa idē  
tempus. Item collisio seu attritio siue eti-  
am fissurae matricis, aut eorum quae circa  
sunt, nonnunq; etiam dolores intestini ma-  
gni. Itaq; quoties fit, ut menstrua ad ple-  
num à partu nō expurgentur, adhiberi ea  
puerperae debent quae menses cient, siue  
id fiat pharmacis, siue pedum lotione, siue  
fuffitu, siue odoribus siue emplastratione,  
siue herbarum coctarum et maceratarum  
impositione, siue ungentis, & id genus ali-  
is, pro conditione personae atq; periculi cō-  
ueniētibus, quae omnia sic nota sunt, ut mu-  
lieres mediocriter peritae ea cognoscant.

Danda-

Dandaq; opera est, ut ea quā accurate  
acplene purgetur. Præterea ad hanc rem  
conueniunt omnia ea quoq;, quæ urinam  
mouent, qualia sunt, quæ uenas aperiunt,  
& sanguini ad exeundū iter faciūt, humo-  
resq; & suā materiam ad inferiora cogūt,  
ut artemisia, azarū, sabina, pulegiū, petro-  
selinū, cerifoliū, anisium, maratrū, iunipe-  
rum, ruta, lauribaccæ, chamedris, ualeria-  
na, Cinamonū, nardus spicata, & id genus  
alia. Hæc enim omnia ut urinā, ita & men-  
ses mulierum cient, tametsi nihil horū sine  
consilio prudētis ac docti medici adhiberi  
profuerit, ne forte dū una parte subuenire  
uoles, alia corpus ledas & incēdas. Item ad  
prouocandū mēses facit, si mulier crebro  
sternutet, et inter sternutandū nares et os  
comprimat atq; cohibeat, animāq; reprimat.

Item proderit uentosās adhibere, et quā  
proxime genitalibus in interiore parte pe-  
dum scarificare, aut ex oculis piscium sal-  
sorū siue ungulis equinis genitalia suffire.  
Quod si his non proficiet, tamen si per

ualetudinem puerpera potest, sanguinem mittat, uenamq; sub talis pedum, quam Saphenam uulgo dicimus, incidat, hæc enim menses potius, ciet. Idem faciendum erit si à partu febricitare incipiet mulier, ea enim febris eadẽ ex causa nasci ferè solet, quòd menstrua ad plenum expurgata non sunt quæ hac uena incisa prouocantur. Vti aut debet in febrì, potu ex aqua hordeo tosto aut trito, macerata, aut in qua hordeum & cicer simul decocta fuerint.

Item potu ex aqua in qua Tamarindi decocti fuerint, aut sero lactis. Præterea iure ex gallinis, & malo punico dulci uesci debet, hæc enim & menses ciet, & calores immodicos sedant, & refrigerant, eaque quæ ante constricta & durata fuere, resolunt ac mitigant.

At uero si à partu corpus intumescit, & inflatur, danda erit aqua, in qua cicer, & cuminum contrita fuerint. Item uinum uetus cum electuario, quod uocant Diamarte, aut eo quod uocant Alcakengi, de quib. Auicenn. libro .v. tradit. Item gummi quod dicitur Serapinũ, et Origanũ et mastichẽ.

Præter

Proſunt item in hoc caſu, clyſterium ex hijs  
rebus, quæ inflationes ac uentofitates re-  
primunt & diſſoluūt, aut quod peſſarium  
dicimus, conſtans Ariſtolochia rotunda,  
Squinante, Storace liquida, Doronico &  
Zeduaría.

Rurſum ſi à partu accidant mulieri tor-  
mina, & dolores matricis atq; genitalium,  
ſuffitu, atq; uaporibus, earum rerum quæ  
mitigant ac leniunt foueri atque curari de-  
bet, ut ſunt Malua, Ibiſcus, Fenum græ-  
cum, Cymínium, Camomilla, Mellifophi-  
los uel Barotum, cícuta.

Proderit etiam ungi & oleo ſeſamino,  
aut amígdalino dulci. Quod ſi calores pau-  
lo remiſſiores erunt, uti poteſt Theriaca,  
aut Triſſera magna, quæ uocatur, cum ui-  
no in quo Arthemíſia rubea, aut matrica-  
ria decocta fuerint.

Item contra dolores genitalium, accipe  
Pulegium, Policariã, folia Lauri ſex, eaq;  
decocta ſuppone genitalibus mulieris, ut  
uapore qui inde exit, foueatur.

Item accipe, Rutam, Arthemíſiam ru-  
beam, Abrotanum, eaq; contrita oleo Pu-

E

legitima tempera, deinde omnia in unum collecta, in ollam indito ibique calefacta, rursum eximito, & in panniculum simul inuoluta, genitalibus mulieris imponito.

Item accipe Camomillæ ac Lini singulorum manipulos iiii. eaque contrita & in facculum simul colligata, cum uino albo decoque, decocta genitalibus impone.

Item accipe musci pondere 2. gran. & uino hauriendum mulieri prebe.

Item accipe cepas candidas, easque cineri calido impone, quas cum tostæ fuerint, contere cum butyro nondum diluto, aut salso & in formam emplastri redige, redactum uentri impone, præterea thure candido atque storace genitalia suffito.

Quod si mulier doloribus circa terga & lumbos uexetur à partu. Accipe Camomillæ, Baroti, singulorum manipulos binos, Absynthij, Abrotani sing. manipulos singulos, Artemisiæ manipulos tres, Cinnamonomi, & myristicæ nucis contritorum unciam dimidiam, eaq; omnia in ollâ imposita & foco admota, ter aut quater ebullire facito, Deinde eam aquam spongia receptam

ceptam ac calidam tergo ingerat, illudq;  
ita aliquoties imbuat, aut si hoc nolit, om-  
nia illa in sacculū simul colligata, tergo im-  
ponat, Quod si hoc parum proficiatur, ac-  
cipe oleum Nardinum, oleum Liliꝝ candi-  
di, singulorum pond. unciam cū dimidia,  
præterea nucis muscatæ contritæ pondere  
drachmam 1. eaque inter se temperata ter-  
go inunge. Aut accipe olei Aneti, olei Ca-  
momillæ, singulorū pondere unciam unā,  
olei Liliꝝ candidi, pond. uncias duas, ceræ  
pond. 2. drach. eaq; ad ignem colliquata,  
in unguenti modum redige, eoque ungen-  
to dorsum mulieris illinito.

At uero si à partu menses uehementius  
concitati manēt, itaque abunde fluāt ut ex  
eo mulieri dolores atque languores intole-  
rabiles oriantur, in primis obseruare con-  
uenit, ex qua causā periculum hoc nasca-  
tur, ea enim cognita facilius debita cura ad-  
hiberi potest, causæ autem periculi huius  
uariæ ac multæ sunt, præcipue tamen que  
nos hic ordine adnotauimus.

I. Ex abundātiā ac superfluo totius corpō-  
ris sanguīne.

II. Ex commestione fellis ac sanguinis,  
ex qua sanguis incandescit, & inde pertin-  
git atq; distendit uenas quæ ad matricem  
descendunt & conueniunt.

III. Si sanguis nimis dilutus, ac tenuis fu-  
erit, eoque celerius penetrat.

IIII. Si uenæ ample atque capaces sint, eoque  
plus sanguinis transmittunt.

V. Si matrix inualida & imbecillis, uenæ  
autem debiles atque largæ, ita ut sanguinē  
continere nequeant.

VI. Si corpus solidum ac densū fuerit; ita  
ut poris obstructis, neque sudores, neque  
uapores aut fumū penetrare & exire pos-  
sint, ex quo fit ut intus in corpore humores  
& fluxus generentur, q̄ mulieris proflui-  
um augent, & cum eo unā descendunt.

VII. Si uenæ quas hæmorrhoides appel-  
lant in matrice, aperiantur, & exundent.

VIII. Si matrix exulcerata aut uiciata sit.

IX. Si mulierem collabi, uerberari, aut ia-  
ci contingat, eoq; claustra, aut genitalia of-  
fendi ac lædi.



**X.** Si matrix inter pariendū longo ac difficili labore saucietur.

Quando igitur multæ acuariæ causæ sunt, ex quibus fit ut menses uehementius & ultra modum concitentur, oportet hoc loco mulieres minus uerecūdas esse, & me dico laborem atque dolorem suum indicare, qui pro sua doctrina, suoque iudicio, facile ex qua quicq; causā natum sit cognoscet, et remedium atq; curam pro eo ac debet, adhibebit. Quanquam autem uaria ac multa sunt, quæ profluuium, de quo hic dicimus, sistant, ut Electuaria, Confecta, Trochisci, Potiones, pulueres, Clysteres, odores, Suffitus, Balnea, Emplastra, Vngēta, de quibus etiam inter mulieres, mediciter peritæ sciunt. Ea tñ precipue quæ ad hanc rem faciunt, & plurimum iuuant, in gratiam honestiss. matronarum collecta, hic subnotauimus.

Principio igitur contra menstrua immodice concitata proderit, brachia quam ualidiss. ligari & constringi, nō autem pedes, aut crura ut quidam male docent, deinde uentosam aliquam pacem aut poculum

uitreum, sub marnillas, sed tamē cute nō incisa, admoueri, & uelamēta linea acetoma defacta, inter umbilicum & genitalia corpori imponi, ipsis autem genitalibus, ea inferi quæ sanguinem profluentem sistunt, ceu sunt, balauſtia, aut cortex granati, quāpsidam uocāt, carabe, terra sigillata, bolus armenus, sanguis draconis, Hæmatites lapis, Rosa purpurea, thus albū, galla. Quæ omnia simul, aut eorum quod simul habere licet, pondere ac mensura pari, in puluerem redacta, et uino nigro crasso in emplastro modum temperata, & in facculū quoddam angustum & teres, pollicis crassitudine, longitudine autem digiti, indita, genitalibus inferenda sunt.

Item aliud emplastrum extra corpori imponendum sic conficitur: Accipe lapidis Hæmatitis, Boli armeni, singulorū unciam dimidiā, sanguinis draconis, succi quod Liciū uocant, singulorum pond. .i. drachmarum, Karabe, cupularum glandinum, nucis cypressi, Balauſtiæ uel psidæ, singulorum pond. .i. drach. & scorix ferri, pondere drachmam cum dimidiā, terebintinæ, colo-

colophonix, pondus par, & quantum ad  
portionem emplastri satis erit, eaq; omnia  
inter se cōtere ac in puluerem redige, et ex  
inde in emplastrū redacta utero impone.

Item unguentum ad eundem usum hoc  
modo facies, accipe olei myrtini, olei rosar.  
singulorum pond. .selibrae, karabae, rasurę  
eboris, rasurę cornu caprini, corallij rubri,  
terrę sigillatę, thuris candidi, singulorum  
pond. .i. unciam, cerę candidę pond. .s. unci  
as, eaque simul temperata in unguentum re  
dige, eoque uterum & genitalia perunge.

Item balneum, quo contra eūdem labo  
rem, mulier lauari debet, accipe absinthij,  
plantaginis minoris & maioris, extremi  
tatum uitis, palmitum recentium mori a  
grestis, prunorum immaturorum, Aca  
tiorum immaturorum, pīrorum agresti  
um, mespilorum, singulorum manipulos  
binos, foliorum rosę rubeę manipulos ter  
nos, corticis quernę manipulos quaternos.  
Solatri, carduorum singulorum manipu  
los binos, pentaphylli foliorum & radia  
cum, tormentillę radicum, colubrinę, sin  
gulorum manipulos singulos.

præterea calicum glandis, quantū scutella  
capit, gallæ, glandis decorticatæ, burſæ pa  
ſtoris ſingulorū manipulos binos, atq; hæc  
omnia in puluerem redacta, aut quæ redigi  
non poſſunt conſciſſa, cū aqua pluuiali aut  
ea in qua decem aut duodecim lapides uſti  
extincti fuerint, decoquito, & in hac, in  
qua decocta ita fuere, aqua tepida, & uſq;  
ad umbilicum aſcendente mulier lauatoꝝ,  
poſtea autem ubi è balneo egreſſa eſt, ſi ſiti  
afficiatur, electuarij Athanaſiæ ſiue Micle  
tæ pond. 2. drach. cum aqua plantaginis,  
aut ſi ſiti tum ita afficiatur cum uino rubeo  
ſorbeto.

Nec non & hæc electuaria, quæ ſubno  
tauimus eodem proſunt, accipe Saccari ro  
ſarū neteris, pond. 2. unciarum, coralli ru  
bri, cōbuſti eboris, boli armeni ſingu. pōd.  
2. drach. hæmatitis pond. 3. drach. eaq; oīa  
contuſa, & ſaccaro roſato temperata, ueſe  
peri ac mane cum aqua plātaginis aut bur  
ſæ paſtoris, pond. 2. drachm. ſumito.

Item aliter, accipe hæmatitē, eumque  
in cote attere, attritum aqua plātaginis ab  
lue, ita tamen ut ablutum colorem hæma  
titis

titis rubeum referat, atque eam inde aqua  
seu eum succum mane ac uesperibina, aut  
terna coclearia laborati haurienda p̄beto.

Præterea & trochisci ex myropolijs ad  
hanc rem conferunt, ut trochisci Karabæ,  
trochisci boli armeni quorū pondus drach  
mæ aut amplius cum aqua plātaginis men  
sura quinque cocleariorum, contritum at  
que maceratum sorbendum dato. Quod si  
quis ultrā aliquid requirat, à medicis id pe  
tat, nos hic quæ maxime necessaria, eaque  
breuiss. tamen indicamus.

Iam si à partu accidat mulieri, ut in locis  
aut genitalibus membris ulcera aut aposte  
mata nascantur, tunc ipsa ulcera expurgan  
da & curanda sunt, dolores autem lenien  
di & mitigandi succo ex baccis solatri ex  
presso, & succo plantaginis, itemq; oleo ro  
sarū ita ut hæc probe inter se temperata ul  
ceri affundantur, aut cum lana imposita in  
stillentur.

Item aliter, accipe albumen oui, lac mu  
liebre, & succum portulacæ, eaque tempe  
rata inter se, loco ulcerato infunde. Item  
balneum apparetur, aqua, in qua p̄sida, for

lia rosæ rubæ, calices glandiũ, cortex quæ-  
erna, tormentilla, colubrina, & pentaphyl-  
li folia cū radice decocta fuerint, eoq; mul-  
ter usq; ad umbilicũ insidēs lauetur. Postq;  
autem ulcera ipsa purgata, atque sanata e-  
runt, inungenda erunt unguento albo aut  
rubeo, quæ in myropolijs ad hanc rem con-  
ficiuntur, aut alijs quæ & refrigerāt, & salu-  
bria erūt. Et quo pacto exulceratis cura ad-  
hibetur & medicina, eodem pacto et ijs qui-  
bus genitalia aut loci aliqua parte rupta fu-  
erint, subueniendum est.

Præter hæc accidit interdum ut anus pu-  
erperis egerat sese, proinde quoties hoc fit,  
obstetricis erit, manibus uino albo calefac-  
tis, intestinum hoc sensim reducere, et loco  
restituere, si forte contingat, ut facile hoc  
nequeat, quod tumore intestinum illud in-  
flatum sit, debet eadem, butyro cum uino  
colliquato lanam intingere, eamque ita  
humectatam intestino extanti circumuol-  
uere, atque fouere, donec tumor ille resit-  
dat & euanescat, & tum eūdem suo locore-  
stituere, potest hoc idem fieri lana, tepido  
lacte

lacte, perfusa.

Deinde autem ubi intestinum reductū ac loco restitutū erit, foris adhibere & obligare conuenit ceram, mastice aut thure candido colliquatam, linteoque obligato, ne ea relabatur, adstringere. Et hoc toties fieri oportet, quoties egerendum aluū puerpera ab it, donec intestinum plane consolidatum fuerit.

Quod si autem cera uti nō uoles, lanam oleo Mastiches aut Nardī spicati, imbuta & humectata ad eam rem adhibere licebit ita ut calefacta imponatur, obligeturque ut supra.

Item aliter curabitur hoc modo, ablue intestinum aqua, in qua ea quę exiccant et contrahunt, ut sunt galla, nux cypressi, psida. Karabe, mastiche, thus, sanguis draconis, decocta fuerint, abluītque cornus ceruini combusti puluere conspergito, conspersum reducito, ut supra.

Rursum si fiet, ut à partu mulieris loci erumpant, foueri & collui primum iīdem debent aqua, in qua decocta fuerint quę sequuntur, in hunc modum.

Acci



Accipe nucis cupressi, Nardi spicati, psida, balauſtiæ, calicum glandis, singulorū pond. uncia unius, mespilorum & sorborum immaturorum, item malorū, prunorum & acatiorū itidem immaturorum, singul. manipulos singulos, & quæ in puluerem redigi possunt, redige, cetera minutatim conſcinde, eaq; oīa, aut quot mox haberi possunt, aq̃ pluuiali, aut in qua chalybs feruens tinctus sit, decoque, eaque aqua puerpera insidens ad umbilicum usque lauato, aut si lauare nolit, spongia eadem aqua intincta & humectata, seu lana quoque si malit, matricem collinito & foueto, quibus factis eadem candido linteolo abstergito & puluere qui sequitur, subtiliss. contuso, & per sericum cribrato, conspergito.

#### PVLVERIS Compositio.

Accipe thuris, Karabæ, gallæ, psidæ, Balauſtiæ, nucis cypressi, aluminis, antimonij, Boli armeni, Mastiches, pondere æquali, eaque simul contere, & puluere hoc, ut dictum est, matricem consperge, deinde leniter submoue, & reductum calefactis linteis obligato. Quod si matrix intumuisse, indu



duruiſſetq̃, ita ut facile reduci ob id nō poſſet, reſtinguendus tumor eſt uiuo calefacto, in quo butyrum liquatum ſit, atq̃ ita tumore ſedato, ipſa reducenda eſt. Poſtea autem uentōſæ ſingulæ ſingulis partibus, genitalibus proximis, ſub ipſum uterus, ad moueri conuenit, ipſamq̃ mulierem intergum reclinari, ita ut media corporis pars proſtet, atq̃ tum puluere illo ſuperiore locos conſpergi & obligari, donec confirmetur, neq̃ amplius ſe emoueant.

Rurſum ſi à partu contingat, ut mulieris umbilicus diſſoluatur, ſeſeq̃ aperiat, accipiendum erit tenue licinium, et ſubtili aliquo linteolo circumuolutum, ſingentōq̃ quod ſequitur illitum, umbilico ſoluto inferendum erit. Vngentū uero fit hoc modo.

Accipe thus candidum, idq̃ in puluere redactum, albumine oui ſic tempera, ut liquidi mellis modo fluat, hoc & ipſum umbilicum foris atq̃ intus inungito, & liciniū eo intinctum, umbilici rupturæ inferito, ac ita umbilicum foris obligato.

Postremo, accidit interdum ut ob difficultatem pariendi, genitalia & inteſtinum  
ma

magnum raptura coniungantur, unumque  
uulnus amborum fiat, & per id matrix pro  
labatur, quod periculum præcipue accidit  
quoties genitalia mulieris per quæ partus  
egeri debet, teneriora, atque angustiora  
fuerint, & partus magnitudine sua ur-  
geat atque instet, ut rumpendo uiam ip-  
se sibi aperiat. Itaque quoties malum hoc  
accidet, principio matrix colluenda, foun-  
da, atque in locum suum reducenda est, eo  
modo, quo paulo ante docuimus, Tū rup-  
tura atque uulnus illud refartienda, certis  
inter se spatijs serico filo cute utrinque con-  
futa, quo pacto & chirurgi vulnera solent,  
atque hæc prima ratio curandi est. Quæ si  
minus commoda erit, poterit uulnus illud  
& in hunc modum curari, ut consuendo ni-  
hil opus sit.

Accipe duo linteola, quorum longitudo  
æquat longitudinem vulneris, latitudo  
autem digitos latos duos, ea emplastro illi-  
ne tenaci aliquo, & quod fortiter inhereat,  
& utrinque vulneri apponito, ut fissura tã-  
tum vulneris, latitudine culmi ac circa, ex-  
tet & appareat, deinde linteola illa, fortiter  
iam

lam adherentia et immota, mutuo confue,  
carne seu cute intacta & illesa, ceu item chi  
rurgi interdum solent, confutisq; picem  
liquidam infunde, & sub ijsoræ vulneris  
utrinque coalescent.

Item, aliter, accipe consolidam maio=  
rem, eamque arefactam in puluerem con=  
tunde, postea cyminum, et cinnamomum,  
utrumque in puluerem redactum priori  
adde, interq; se temperata atque commix=  
ta, ea vulneri mulieris insperge, curabi=  
turque.

## DE ARBORTIENTIBVS ET

*caussis abortuum? quibusq; reme=  
dijs ijsdem præcaueri pos=  
sint. Cap. VIII.*

**A**Bortus fit, quoties ante legitimum  
tēpus partus immaturus egeritur.  
Id autem multifariam contingit, aut enim  
embrio anteq; in utero uitam cōcepit, effū=  
ditur, aut partus postq; uiuere cœpit, non  
dū tñ in utero se mouit, hoc est ante quintū  
mēsem egeritur, sepe etiā post qntū mēse.  
uide=

videlicet cum partus præter naturam, & communem cursum emortuus, nonnunquam uiuens quoque, ante consummationem temporis & perfectionis erumpit. Cuius quidem rei multæ ac uariæ causæ sunt. Nam & os matricis interius quod uocant, sæpe numero ita amplum ac spaciosum est, ut non recte occludi, partumque continere possit aut malis humoribus, ita lubricum & lene est, ut ille ultro prolabatur. Et ipsa matrix interdum ita male disposita intus, & humoribus plena est, ut semen genitale, aut conceptum et informatum embryonem retinere nequeat. Præterea morbi quoque, ut sunt apostemata, ulcera, & id genus, in causâ nonnunquam sunt, quæ matricem debilitant, & ad abortiendum impellunt.

Item fit nonnunquam, ut Cotylidones, hoc est nerui illi quibus in utero partus illigatur, & per quos alimenta accipit, uiscosis & crassis humoribus obstruantur, aut inflatibus distenti rumpantur, ex qua re fit, ut partus cum debito nutrimento priuetur, plerumque emoriatur, præcipue autem altero aut tertio mense, quam conceptus est, embryo  
ex

ex hac causa denſcitur, ſic enim Hypo. ait.  
Quæcūq; mediocri corpore, hoc eſt, neq;  
cratſo, neq; gracili nimis fuerint impregna-  
ta, eas ſi abortire contingat, altero aut ter-  
tio à conceptione ſtatim menſe, nulla eui-  
dente alia interueniente cauſſa, neceſſe eſſe  
cotylidones malis atque uiſcoſis humori-  
bus, diſtentas ac ruptas ſuſtinere ac alere  
partum non potuiſſe. Et Auicēna plerum-  
que, inquit, pregnantēs abortire circa alte-  
rum aut tertium menſem ſolent, Cotylido-  
nibus, humoribus, atque inflatione diſten-  
tis. Præter hæc abortus nonnūquam fiunt,  
propter loca matrici propinqua morbis ac  
uicijs infeſtata atque corrupta, ut cum in-  
teſtinum rectum exulceratione, ficu, aut  
hæmorrhoidē infeſtatur, aut ueſica calcu-  
lo, tumoribus, ulceribus aut ſtranguria la-  
borat. Nam ex magno, duro, & aſſiduo ni-  
ſu, qui in morbis atque laboribus, ſedis atq;  
ueſicæ accidunt, generantur item magni  
motus ad inferiora protrudentes, ex quib.  
Acetabula, ſic enim latine τὰς κοτυληδόνες vo-  
cant, rumpuntur.

Fit item abortus ex Tenafmo, qui mor

F

bus appetentiam egerēdi alui pcreat, cum  
homines multum quidem nituntur, nihil  
tamen aut parum egerunt. Sic enim &  
Hypocrates ait. Pregnans, quæ tænasmo  
corripitur, plerumque abortit.

Item tussis immodica abortum facit, ut  
idem Hypocrates testatur. Nec non ma-  
cilentis & exhaustis corporibus quæ sunt,  
abortus familiaris est, Quòd ut Auicen-  
na tradit, quæ eiusmodi sunt morbo aut ca-  
su aliquo factæ, cibum omnem, quem su-  
munt, in alimentū & restitutionem corpo-  
ris pristini conuertunt, nihil alimento par-  
tus reliquentes, ob quam deinde penuri-  
am, in utero partus debilitantur, neq; ma-  
nere possunt, sed ad exitum ante tempus  
detruduntur.

Item abortus contingit ijs, quæ nimia  
cruoris destillatione, aut mensium proflu-  
uio uehementiore laborarunt. Nam ita  
Hypocrates ait, pregnans si menstrua de-  
ijcit, fieri nō potest, ut partum incolumem  
& saluum ferat. Quod tamen ita intelli-  
gendum est, si menses concitatiores eant,  
&

& pregnans corpore inualido ac macilento sit, aut si post tertium mensem menstrua fluant, fieri enim potest, ut primo & altero mense, absq; damno illa deſciantur, quãdo adhuc partus exiguus & modicus est, neque magno alimento eget.

Item abortus contingit sanguinem mittentibus, ut Hypocrates ait, quod eo referendum est, si pregnans parum sanguinolenta erit. Nam quæ sanguine abundat, eiusq; plus habet, quam uel sibi, uel partui opus est, ea sanguinem mittere absq; periculo potest, post quartum mensem tamẽ, & ante septimum. Quamq; nulla sanguinem mittere facile debet, si non iusta & idonea causa id postulet.

Item abortus accidere solet ijs, quæ medicina uehementiore aluicent, ante quartum, aut post septimum mensem.

Et si forte necessitas posceret, ut pregnans purganda foret, id quod non nisi euidentibus ac manifestis ex causis fieri debet, minore cum periculo inter quartum & septimum mensem purgabitur, si mō id

moderate, & leni aliqua medicina fiat, ut  
Hypocrates docet.

Item abortiunt ferè quæ subito uentris  
fluxu soluuntur, sic enim Hypocrates ait,  
pregnans si Lyenteria corripitur, pericu-  
lum est, ut abortiat, quod ita tum intelligi  
debet, si fluxus is, qualiscumque diuturnus  
sit, & pregnans macilenta & exhausta, tunc  
enim sanguis absumitur, & ipsa pregnans  
languescit, ex quo partus, penuria alimen-  
ti, ad exitum cogitur. Nec non abortire so-  
lent eæ, quæ crebro uomitu cientur, & sub  
inde nauseant. Tradit enim Auicenna ex  
nimio uomendi labore, corpus consumi,  
& marcescere, Et interdum eadem ex agi-  
tatione cotyledones rumpuntur.

Item ex fame abortus accidit, si ea nimi-  
a aut longior sit, item ex morbo qui graui-  
or inuaserit pregnantem. Sic enim Hypo-  
crates, pregnans si acuto morbo inuaditur,  
lethale id est. Acuti autem morbi sunt ut,  
pestis, apostema pectoris, Apoplexia, Epi-  
lepsia &c.

Item abortus accidit ex nimia crapula,  
ea enim partus in utero suffocatur et alimē  
ca



ta corrumpuntur. Semper enim crapula  
ut neque concoqui potest, ita sanguinem  
unde partum ali conueniebat, corrumpit.

Item quoties partus imbecillis atq; ægro-  
tus est, siue ægritudinem hanc foris, siue  
intrinsicus causæ mouent ex quibus ma-  
trix impulsæ, ad egerendum partum cogi-  
tur.

Item quoties secundina ante tempus rû-  
pitur, uidelicet cum infirma est, neque par-  
tum continere potest, aut cum humores et  
aqua secundinæ fluunt, quæ illam & lubri-  
cam faciunt, & causam egerendi ministrant.

Item accidit abortus ex nimio frigore,  
quo partus necantur, Ceu fit in ijs regioni-  
bus quæ septentrioni propinquiores sunt,  
aut ex nimio æstu quo pregnans lassatur,  
& unâ partus, & ex eo sustinere se neque-  
unt, id. quod fit in regionibus Austro pro-  
pinquioribus. Et ob hanc causam preg-  
nantes balneis quoque crebris abstinere se  
debent, ea enim trifariâ illis nocere solent.

Primo qui anhelitum incendunt, æstu  
atque calore suo. Deinde quod Cotyledo-  
nes mollificent, & relaxent, uiamq; ad ege-

rendum lubricum atq̃ lenem faciunt, quibus partus prouocantur. Postremo, quod exterior calor, etiam interiorem generat atq̃ auget, ex quo fit, ut cū partus æstum interiorem ferre nequit, refrigerandi causa exitum appetat.

Itaq̃ à balneis abstinere pregnantēs debēt, nisi quatenus sub pariendi tempus, ob partum faciliorem, illis uti necesse erit, ut supra commonuimus, ubi modū præscripsimus, quomodo id minimo periculi metu fieri possit.

Item abortiunt pregnantēs cum intemperies aëris accidit, hoc est cum repēte status & qualitas anni mutatur.

Nam ut Hipocrates testatur, quoties hyems humida incidit, uere sequente sicca & frigida, ijs qui uere eo pariūt, facile abortus, & ex facili causa, euenire solet.

Aut si abortus non eueniet, difficulter tamen pariunt, partusq̃ uiciosos, ægros & qui statim emoriantur, aut si non emoriantur, ualudinarij tamen qui sint, procreant

ant. Nam cum eiusmodi hyemes incidunt,  
fit ut pregnantū corpora magis caleſcant,  
& humida fiant, & propter humiditatem  
atque calorem hyemis, non minus reſol-  
uātur, quā ſi calidis balneis uſi fuiſſent,  
ex qua cauſſa, poſtea frigus quod uere ſe-  
quente redit, corpora relaxata & ſoluta fa-  
cilius & uehementius penetrat ut adurit,  
ut ex eo partus quoque, ut pote qui per hy-  
mem calori aſſueuit & repentinum ac ſu-  
bitum frigus ferre non poteſt, uel in utero  
uel ſtatim poſtq̃ in lucem editus eſt mori-  
atur, aut ſi non emoriatur, egra tamen ſubi-  
tam mutationem hanc perferat, ſeſeq̃ ſuſ-  
tineat, & niſi cum ſummo negotio atq̃ diſ-  
ſicultate uiuat.

Item abortus accidit ex nimia agitatio-  
ne corporis, uidelicet cum pregnantēs uel  
immodice laborando, uel laſciuiter ſaltan-  
do ſe iactant, & cum motu aliquo reſupi-  
nant.

Item quoties caſu aut precipitatione ali-  
qua feruntur aut trudendo, uerberando ſeu  
iaciendo grauiter pulſantur,

Item quoties subito uel ira, uel metu, uel terrore, uel mœrore, uel improuiso nouo ac repentino gaudio corripiuntur, Atq; hæc ferme causæ, abortiendi pregnantibus accidere solent, quæ, ut hoc obiter addam, cum dolore ac difficultate multo maiore abortiunt, quàm secundum naturalem cursum ac modum pariunt, propterea quòd quicquid præter naturam homini accidit, id multo grauius malum est, quam quod naturaliter contingit.

Signa autem abortum precedere hæc solent. Primum, cum pregnantis ubera quæ antea sana, ualida, atque plena fuerant, paulatim minuuntur, subsidunt, & flaccescunt, tunc enim plerumque abortus sequitur, ut Hypocrates & Auicenna testantur. Nam ubera cum subito ac repente flaccescunt & exinaniantur, periculum abortus eodem die minitantur. Quòd si pregnans geminos ferat, & alterum duntaxat uberum, utroque antea sano et incolumi, flaccescat, ei geminorum qui in eo latere quiescit periculum portenditur. Vnde Hipocrates ait, Si dexterum uber deficit, periculum mascululo

culo partui instare, propterea quod plerū  
que, tum gemini partus diuersi generis sūt  
alter maris, alter feminae, masculus dexte-  
ra in pectoris parte quiescere solet, in sinis-  
tra autem femina, proximum signum est,  
cum pregnās magnos dolores ex matrice  
capit, ipsa autem & facie rubescere, ac mē-  
bris contremiscere atq; horrere incipit, id-  
que ceu in febris & cephalalgia, præterea  
cum in interiore oculorum parte uersus ce-  
rebrum dolores percipit, reliquo corpore  
lasso, & languescente. Nam hæc porten-  
dūt instans & breui futurum periculum,  
præcipue si eodem & tempore menstrua  
soluantur, & fluant.

Item quoties fit, ut corpus prægnantis  
infletur, & cum quadam duritia intumes-  
cat, flatusque ultro ac citro currentes ex  
latere altero in alterum feruntur, neque ta-  
men eo uenter grauior aut pōderosus ma-  
gis fiat & hoc si flatus illi perseuerant, mu-  
liere ijs uescēte quæ inflationes ac tormina,  
Hoc enim signum portēdit periculum ex  
flatibus & uentositate, præsertim circa al-  
terum aut quartum à conceptu mensem.

Itaq; postq; causas atq; signa periculi exposuimus: reliquum est, ut quibus idem remedijs præcaueri atq; auerti possit, doceamus, ubi præcipue hoc curandum est, ut pregnans omnia ea uitet atq; fugiat, quæ causam abortiendi periculo prebent, ut satis iam atq; ordine dictum est.

Principio enim si metus sit ex eo, quod matricis os amplum atq; spaciosum iusto magis est, adhiberi ea debent, quæ contrahunt & constringunt, ut sunt balnea, suffitus, ungenta, emplastra, odores, &c. de quibus supra capite septimo diximus, quæ quæ menstrua immodice concitata à partu restinguere atq; cohibere solent.

Rursum si periculum ex eo metuitur, quòd os matricis humidum atq; lubricum nimis est, aut quòd cotyledones viscosis humoribus, & inflationibus siue uentositate aliqua obturatæ atq; obstructæ sunt, auerti periculum hoc & præcaueri medicinis hisce adhibitis debet, quæ purificant, purgant, exiccant, & uentositatem reprimunt. Quamq; non committi in hac parte debet, ut non boni ac fidi alicuius medici consili-  
um

um adhibeatur, propterea quòd uarij huiusmodi humores ac fluxus sunt, neque eadem omnes ratione curantur.

At uero si periculum ex matricis aut eorum quæ locis genitalibus proxima sunt, uicio, morboue, immineat, ceu sunt exulcerationes, tumores, uicia sedis, stranguria, & id genus, consulendi medici erunt, qui quo pacto unumquodq; illorum tolli atq; curari debeat, indicabunt. Quod si pregnantans ex eo periculum metuit, quòd macilentia & exhausta corpore sit, uesci ijs conueniet quæ humectant & pinguefaciunt, ceu sunt caro animantium iuuencorum, capri, hœdi, agnina, uitulina, perdices, lagopodes & id genus.

Rursum si periculum ex morbo aliquo acuto incidet, subueniri debet medicinis ijs, quib. talis morbus curatur. Si à fame, sedari ea debet cibo mediocri ac potu, non crapula, contrà si à crapula, id quod hodie passim fit, non sine turpitudine quoque, abstinentia per tempus utendum, & si res ferat



ferat, purgatiōe quoque mediocri corpus  
subleuandum est. Quòd si sanguine  
abundet pregnans, non inutile erit sang-  
uinem, quamq̃ modice, mitti, ita ut quod  
abundat, quoque partus suffocari in utero  
posset, id sanguinis tantum mittatur, de  
qua tamen re supra quoque satis ut puto à  
nobis dictum est, quæ qui uolet huc repe-  
tat, Præterea si pregnans periculum metu-  
at ex uehemētiore ac diuturna tussi, ex uo-  
mitu nimio, ex Lyenteria, ex tenasmo, aut  
proflutio sãguinis, siue id naribus siue alijs  
corporis partibus accidat, medicos consu-  
lendos censeo, omniaq̃ ista mala q̃ maxi-  
ma commoditate, & moderatione procu-  
randa esse. Postremo si propter fragilita-  
tem, aut rupturam secūdinæ periculum in-  
stet, ob quam causam partus contineri di-  
utius nequeat, Ei uero difficultati medici-  
na alia adhiberi facile nulla potest, nisi ut  
quàm maxime diligentiam adhibeat preg-  
nans, ne magnis atq̃ multis agitationibus  
ac motibus concuciatur, ne saltando, currē-  
do, stādo, itando, aut res ponderosas sustol-  
lendo ac portando se ipsam offendat. Et in  
sum



summa, omni cura atque diligentia hoc efficiat, ut eas res, ex quibus periculū huiusmodi aliquod nascitur, euitet atq; fugiat.

DE PARTV BVSE MORTVIS, Q. VI.  
*bus signis cognoscantur, & quo pacto iſdem  
pellantur. Cap. IX.*

**C**onsentaneum hoc loco est, ut de partibus emortuis quoque dicamus, quibus agnoscantur, & quo pacto iſdem à matre pelli possint, ac debeant. Signa itaque emortui in utero partus hæc sunt, primum. Si pregnantis ubera subito flaccescunt, de qua re supra quoque cap. octauo diximus. Secundū, si partus in utero se amplius non mouet, antea moueri cæptus ac solitus. III. Si partus conuertente se matre in alterum latus ab altero, lapidis aut imoti ponderis inſtar, recidat, IIII. Si pregnantis uterus atque umbilicus refrigescant, qui antea solito calore temperati fuerant. V. Si foetidi humores ex locis profluāt, præsertim post morbum aliquem acutum. VI. Si pregnantis oculi recessisse intro uidentur, & color albus in fuscum aut ferrugineum conuertitur, præterea oculi, nasusq; obstupescunt

cunt, & horrent, labia autem liuescunt,

VII. Si pregnans infra umbilicum, & circa genitalia uehementibus doloribus concitatur, facies autem ei colore in deteriorem mutato, præter solitum deformatur.

VIII. Si pregnans ijs uesci concupiscit, q̃ & repugnantia naturæ sunt, & solita edere aut bibi non consueuere.

IX. Si pregnans in somnijs uexatur.

X. Si continua stranguria laborat, & cū magno negotio, multoq̃ nisu, sed tamen frustra & sine effectū, aluum egerere subinde appetit.

XI. Si pregnantis anhelitus foetere incipit, id enim plerumq̃ altero aut tertio die, quàm partus emoritur, accidit.

XII. Si manus calescenti aqua madefacta, uteroq̃ pregnantis imposita fuerit, eiusq̃ contactu partus non mouetur.

Atq̃ ex his quidem sanguis quanto plura simul concurrent, tãto certius indicium hoc est, partum in utero mortuum iacere. Itaq̃ opera danda est, ut is primo quoq̃ tempore pellatur. Sed hic rursus attendendum erit, num fieri possit ut salua & in  
colu-

columi matre pelli possit. Quidam enim eiusmodi sunt, ut uiua & superstitē matre pellantur, Alij hoc non possunt. Atq; horū indicia hæc sunt. Si inter pariendum mater exanimis deficit, & subinde ecstasi corripitur. Si obliuiosa erit & languida, lassæq; membra ægre attollit & mouet. Si uoce altiore compellata, aut nihil, aut parum atque hoc submisit, et ceu deficiente uoce respōdet. Si subinde Spasmo inuaditur, Si cibum respuit, Si pulsus arteriarum citatior sed languidior quoq; erit. Quæ signa postq; in pariente apparēt, líquido cognosci potest, eam incolumem atq; superstitem partui non māsūram esse, proinde cura eius Deo potiss. commendāda erit. Sed in qua signa hæc nulla erunt, spes bona est, saluam atq; incolumem, pulso partu, illam fore, qua propter dāda opera est, ut quā primum emortuo pondere liberetur. Id quod bifariā, aut medicina expulsiua, aut instrumentis ad id comparatis, fieri solet. Primum sine instrumentis, p̄suffitum hoc modo. Accipe ungulam, aut stercus asini, ijsq; incensis suffumiga parentis genitalib.

Item

Item aliter hoc modo. Accipe exnnias  
serpentis, Myrrham, castoreum, Sulphur,  
Galbanū, Oppoponacum, Rubeam tinc-  
torum, stercus columbinum, siue accipi-  
tris, eaq̃ omnia, aut singula contrita, & fel-  
le bubulo macerata, in pilulas magnitudi-  
ne auellanae redigito, pilulaq̃ alia post alia  
carbonibus imposita & incensa, per fistu-  
lam ad genitalia parientis fumum subduci  
to.

Item aliter sic. Accipe Thymiam, op-  
ponacum, Galbanum, Sulphur uiuum, sin-  
gula pondere pari, eaque omnia felle bubu-  
lo temperata, in pilulas redigito, redactis  
suffitum, ut supra facito.

Item accipe Azam fetidam, pond. semi-  
drachmę, rutę drach. treis, myrrhę drach-  
mas duas, eaque in puluerem redige, pari-  
entique ex eo singulis uicib. singulas dra-  
chmas cū uino albo, aut aqua in qua Sabi-  
na decocta fuerit, epotandas dato.

Item accipe aquam, in qua decocta fue-  
rint, fici, foenū gręcum, origanum, eamq̃  
potandam parienti prebe, lubricitatem  
enim generat, Atque exinde reliqua quę  
supra

supra diximus, ad partum emouēdum, ad  
hibe.

Item accipe gummi Armoniacum, op-  
poponacum, Helleborū nigrum, Staphi-  
sagriam, Aristolochiam longam, & colo-  
cynten absq; granis, eaq; omnia contunde  
& felle bubulo unā cum succo recentis ru-  
tæ tempera, temperatisq; pessarium ex la-  
na factum, inūge, & humecta, probeq; hu-  
mectatum genitalibus parentis impone.

Item accipe pessarium ex lana factum,  
longitudine et crassitudine digiti, idē suc-  
corute, cui scammonia intrita fuerit, intin-  
ge, intinctum genitalibus parentis insere.

Item accipe Aristolochiæ rotundæ, Sa-  
binæ, Nasturcī hortensis, singulorū pon-  
dere pari, eaq; contere, & felle bubulo  
misce, postea pessaria, mensuræ cuius su-  
pra diximus, contritis ac mixtis inunge, &  
genitalibus inuncta immitte.

Item, pariens si bibat lac alterius mulie-  
ris, partum emouet.

Item accipe succi Dictami aut pulueris  
eiusdem radicis drachmas duas, easq; pa-  
rienti, si nimio calore non vexetur, tum u

no, aut si calore uexatur cū aqua tepida ebibendas dato, partusq; sine damno parientis pelletur.

Item, accipe Myrrhæ drachmas quattuor, Cinnamomi, Galbani, Castorei, singulorum ponderum, drachmas duas, Opponaci drachmam unam, eaq; omnia bubulo felle temperata, in pilulas drachmas singulas pendentes redige, carbonibusq; impositis & incensis, genitalia parientis, odore atq; suffitu eo imbue. Hoc enim uapore & partus emortui, et inflammatio & sanguis suffocatus pelluntur.

Item accipe mentæ aquaticę, Abrotani, Artemisiæ, singulos manipulos, Asphalti, semunciam, Rubeæ tinctorum uncias ij. & semis, camomille, Baroti, fenigreci, singulorum uncias duas, eaq; omnia pluviali aqua decoque, & in aqua eadem parturientem lauari seu balneari facito. Postea accipe adipis gallinacei, adipis Anatū, singulorum ponderum drachmas quaternas, quib. adde olei Aneti uncias duas, ijsq; caput eiusdem è balneo exeūtis perurge, & post hæc ossa dactylorū pondere drachmę

me & dimidiū, contrita & croci scrupulo  
uno tēpata, cū uino albo absorbenda dato.

Item accipe Oppoponacum, et ex eo pes-  
sariū, mēsurā digiti cōpone, genitalibusq;  
parientis insere, emortuū. n. partū pellit.

Item accipe Galbani drachnam aut mi-  
nus aliquanto. lactis autem capræ sesquiū-  
ciam, aut uncias duas & in hoc Galbanum  
contritum atq; maceratum, parienti epo-  
tandum dato.

Item accipe Galbanū, succo Artemisiæ,  
contritum & temperatum, & ex eo empla-  
strū, addito cere modico factū, linteolo, cul-  
mi crassitudine inducito, linteolūq; ea lon-  
gitudine producito, ut inter ūbilocū & gen-  
italia ex uno latere in alterum extendi pos-  
sit, eoq; parturientem emplastrato.

Item accipe Theriacum, quā uocāt diates-  
seron vulgo, eamq; parienti absorbendam  
dato, partumq; emortuum expellit.

At uero si iā dictis medicinis nihil pficia-  
tur partusq; emortuus abscedere nolit, tū  
seuerior adhibenda cura, instrumētaq; ad-  
moueri debent, ceū sunt vncini, forcipes,  
& id genus alia, in hunc usum fabricata.



perinde ut in sequentibus dicemus.

Principio igitur reclinanda pariens erit, ita ut in dorsū iacens capite deprimatur, pedib. autem & media parte corporis sublimetur, Assistentibus utrinq̃, quæ illam manibus fortiter retineant aut alligent, ita ut attractio partu, eodem tractu ipsa itidem attrahi nō possit. Deinde obstetrix læuam oleo cādidi Lilij aut alijs, que lubricum ac lenie faciunt perunctam, & extentis digitis coarctatam, claustris genitalium apertis inserat, & quo situ atq̃ habitu partus in utero se habeat, tactu pernoscet, quo commodius atq̃ facilius uncinos, atque instrumenta implicare, & extrahere illum possit. Quod si itaq̃ fiat, ut partus in caput prociderit, implicandus uncinus in alterum oculum, aut in palatum, aut sub mēto in collum, aut in scapulum, aut in quamcūq̃ partem corporis maxime commodum uidebitur, atq̃ ita sensim attrahendus erit. Si uero in pedes partus procidit, uncino apprehendi debēt ossa quæ supra genitalia membra sūt, ceu sunt costę, ossa pectoris aut spinæ. Iniecto autem uncino, nō statim attrahere



here obstetrix debet, sed iniectum dextra  
continens, læuam amplius ad partum inse-  
rat, & alterum uncinum ex diuerso prio-  
ris infigat, ac deinde utrumq; simul amba-  
bus manibus attrahat, ut partus ab utraq;  
parte equaliter procedat. Attrahendum  
quoq; sensim & leniter erit, non recto &  
simplici tractu, sed ita, ut inter trahendum  
nunc huc nunc illuc reflectat, & uelut labe-  
factando & nutando partum emoueat.

Admouere quoq; inter attrahendum indi-  
cem probe, ut supra diximus, perunctum  
debet, & sicubi hæreat partus aut implici-  
tus & illigatus fuerit, à locis & genitalibus  
resolvere, & ad abscedendum liberum at-  
queabilem reddere. Quod si itaq; hoc  
modo partus procedat, uncini semper ul-  
tra iniiciendi, & altiora membra subinde  
apprehendenda erunt, donec totus emoue-  
atur.

Contrà autem, si contingat, ut alteram tan-  
tum manum virtus ostendat, neque facile  
ea reduci sursum possit, propter angusti-  
am claustrorum, illigari ea linteo aliquo,  
ne rursum elabi possit, debet, atq; ita tum

eo usq; attrahi, donec totum brachiū emou-  
ueat, quod ubi motum erit, à corpore reli-  
quo resecari debet. Atq; idem faciēdū erit,  
si utraq; manus, alter pes, amboue, seorsim  
cū sequente reliquo corpore, neq; ipsi scō-  
mode ac loco restitui ualētibus abscedant,  
& ut manus cū brachijs ab humero, sic pe-  
des toti, à femore resecandi sunt, ad quam  
rem chirurgi sua instrumenta certosq; cul-  
tros, forcipes, uncinos & forcipes habebūt,  
quibustalia membra q̃ facillime atq; celer-  
rime abscindi atque à reliquo corpore dis-  
solui possunt. Resectis autem & ablatiis il-  
lis in hunc modum, reliquum deinde cor-  
pus, moueri atq; reuerti tantisper debet do-  
nec ad egerendum habile atq; aptum figu-  
retur & tandem à matre expellatur.

Quòd si caput in partu ex inflatione, aut  
tumore, aut fluxu aliquo tantę magnitudi-  
nis foret, ut angustiam claustrorum pene-  
trare non posset, tum obstericem conue-  
nit, cultello phlebotomo, aut alio aliquo be-  
ne acuto, caput perstringere, quo diffluen-  
tibus inde humoribus & flatibus in arcum  
coeat & constrictus fiat, Quòd si non casu,  
sed

sed natura tam magnum idem sit, ut facile  
abscedere nequeat, confringi atq; contudi,  
& ad pauca redigi quoquo modo debet, ip-  
saq; etiam caluaria forcipiculis, quibus ad-  
dentes emouendos chirurgi utuntur, ex-  
trahi debent.

Rursum, si post egestum caput, pectus  
in foribus obstaret, & propter angustiam  
claustrorum abscedere non posset, Conue-  
niente eodem modo, etiam pectus comminui  
& diffringi, & quoquo modo in frusta re-  
digi, exeundoq; aptari.

Eodem modo si reliquum corpus suffu-  
sum, & turgens foret, intercidendum  
erit, quo, ut supra de capite diximus, & hu-  
mores effluant, & ipsum residat, inq; se re-  
deat.

Porro, si casu aliquo aut morbo fiat, ut  
os matricis propter apostemata, exulcera-  
tionem aliquam minus apertum, minusq;  
lubricum, sed contractum & siccum foret,  
non cōuenit ante de pellendo, egerendoq;

partu emortuo cogitare, aut laborem capere, quàm per oleum et uarias pinguedines, item per balnea, aut suffitus, matricem leuem atq; lubricam reddideris, uiamq; exeundi planam ac facilem aperueris, de quibus supra Cap. V. abunde commemoratū est. Præter hæc, si partus emortuus in la- tus procedat, tum, si fieri potest, conuer- tendus est, aptandusq; pro ut ad exeundū quàm commodiss. uidebitur inungendaq; matrix erit, aut suffitu & odoribus conso- uenda, donec ampliatur, ipsaq; uiam faci- lem prebeat. Quod si conuerti hoc modo partus nō potest, neq; suffitu aut ungentis adiuuatur, comminuendus, & in frustra re- digendus erit, ut antea diximus. Caterum si post egestum hoc modo partum, men- strua immodice concitata fluant, adhiberi ea debent, quibus supra Cap. VII. proflui- uia eiusmodi cohiberi ac sisti docuimus.

At uero si diuerso modo pariens emori- atur inter enitendum, id quod signis, quæ morientes de se prebent, facile deprehendi potest, & partus in utero superstes, spem uitæ ostendat, Principio conuenit morien-  
tis

tis os, & infra genitalia cum matrice aperta, et reclusa seruare, quo per ea et uitalem spiritum partus capere, & anhelitum recipere possit, id quod mulieres medicrit ex paritæ satis norunt.

Deinde reclinatè latus sinistrum recto vulnere nouacula incidit atq; aperiri (nam dexterum latus non ita liberum, propter e par quod in eo situm habet ingressum incidenti prebet) & inde partus inserta manuper vulnus eximi, atq; educi debet.

Quo pacto q nascuntur, cæsares dici solent, ut etiam Romæ ille à quo primo cæsarium familia nomē adepta fuit, primusq; cæsar, eo quod cæsa matre natus, appellatus est.

#### DE RECENS NATIS, Q VO

*modo fouendi, alendi & curandi*

*sint. Cap. X.*

**A**T postq natus est infans, statim umbilicus resecandus spacio tres latos digitos in lōgum à corpore relicto, atq; ita obligandus est, ut etiam Auicenna scribit, parti deinde extremæ, ubi resectus est, inspergendus pulvis ex bolo Armeno & sanguine draconis, Sarcocolla, myrrha et cy-

G 5

mino, singulis pari pondere contritus, in-  
spersoq; lana oliuo intincta, & humectata  
ne decidat, obligari debet: Tametsi alijs ubi  
licum tres digitos à corpore relictum pri-  
mum religare, ac deinde præsecare iubent.

Præterea sunt qui dicant perinde ut lon-  
gitudò umbilici resecti relinquitur, ita &  
linguam in masculo breuiorem aut longio-  
rem fore. Auicenna quoq; de umbilico, p<sup>a</sup>-  
sagia quædam capit. Nam mulier, cum pri-  
mum partum edidit, umbilicus infantis in-  
spici debet, inquit, qui si in parte qua cor-  
pori proximus est, rugas seu sinus quosdã  
non habet, mulieri deinceps sterilitatem  
portendit. Contra autem si rugas siue no-  
dos quosdam ostendit, tot partus ac libe-  
ros matri pmittit, quot numero nodi seu  
rugæ in eo deprehenduntur.

His alijs addunt, rugas eas, si modico in-  
ter se spatio distent, modica pariendi inter-  
ualla, quoq; significare, si longius, longio-  
re etiã temporis interuallo matrem conce-  
pturam atq; parituram esse.

Præterea rugas si rufescunt, masculos  
partus, si candidiores sunt, foeminas signi-  
ficare

ficare, Sed hæc de vmbilico, pro præsentiar  
gumento & loco satis est dixisse.

Cæterum ut unde digressi sumus, eò re-  
uertamur, postq̃ umbilicus resectus atq̃  
obligatus est, totum quoq̃ corpus infantis  
oleo glandium, perungi non inutile erit, il-  
lud enim cutem confirmat, & ceu munit,  
contra ea quæ foris ledere aut offendere te-  
neram possent, qualia sunt, fumi, frigora,  
& reliqua, quæ cum à partu statim infan-  
tem contingunt, ledere solent,

Post unctionem lauari aqua tepida in-  
fantem conuenit naresq̃ digito, cuius un-  
gues præsecti sint, leniter aperiri atq̃ pur-  
gari debent.

Nec inutile erit, olei modicum in oculos  
instillari, Nec non anus quoq̃ infantis con-  
tractari à matre aut nutrice debet, quo citi-  
us ad egerendum aluum prouocetur.

Præcipue autem à calore immodico,  
aut frigore custodiri debet.

Postq̃ autem umbilici par sextans deci-  
derit, id qd ferè post diē tertium aut quartum  
sic



fieri solet, conspergi reliqua debent cinere, ex cōchilijs quæ in paludibus aut lacub. passim reperiuntur, aut ex ungula uituli facto, aut etiã cinere plumbi probe contrito & uino temperato. Præterea cum in fans inuoluitur, & cunis imponitur, danda opera est, ut semper quam molliss. eius mēbra tractentur, deinde unumquodq; membrum suo loco, & recte, non confuse aut distorte illigetur, idq; nō semel uno die, sed sæpius faciendum est. Quemadmodum enim in seminarijs arborum fit, perinde ut recta, aut contorta educuntur, ita eandem formam adulta tenent, ita etiã infātibus accidit, qui si recte & legitime inuolucris suis obligātur, rectis membris, & recto corpore crescunt, sin curuati & contorti conuoluūtur, distortis atq; incuruatis mēbris quoq; adolescunt, itaq; & oculi subinde extergendi sūt lineo quam tenerr. aut serico, & explicāda, extendendaq; brachia, & iuxta latera utrinq; infra uersus deducenda, ut recta iacere consuescant, ultra hæc, uesicam quoq; interdum de mulceri prodest, ut eo minore negotio urinam mittat. Et cum



cum dormitum reponitur, imponenda ca-  
piti mitra, aut eius generis aliquid aliud est  
collocari cō in cunis eo loco debet ubi neq;  
frigus illi infestum, neq; æstus molestus es-  
se possit, caput quoq; paulo sublimius reli-  
quo corpore acclinari debet, totiq; ei, sus-  
pensa desuper fasciā, aut alia materia, um-  
bra inducenda est, ponendum cō ita ut ra-  
dij solis interdiu, aut lunæ per noctem ocu-  
los nō perstringant. In uniuersum autem  
curandum, ut omnia membra quam rec-  
tiss. collocentur, ne aut ceruix reflexa, aut  
tergum nimis elatum, aliaq; alio modo dis-  
torta, & incurvata reclinentur. Porro laua-  
ri debet bis aut ter quotidie, semper à som-  
no, & hoc hyeme aqua calida, æstate uero  
tepida neq; longius in aqua retinere debet,  
quā dum corpore incalescat & rubicun-  
dus fieri occipiat, curandum cō est, ne inter  
lauandum auribus aquam accipiat, inutile  
enim hoc est, & auditui damnosū. Postre-  
mo cum è balneo recipitur, abstergendus  
& confouendus est linteis teneris ac molli-  
ter calefactis, debet cō nutrix aut mater, aut  
quæcunq; è balneo receptum, in uolutura  
est

est, primum e gremio suo primum inclinare, ac tergum leniter mulcere, deinde ut supra diximus, inuoluere, inuoluto autem guttam unam & alteram in nares stillare, id enim uisui prodest, atq; ita tandem loco suo reponere.

## DE LACTE ET NUTRI

*ce, & quam diu infanti mamma*

*præbenda. Caput XI.*

**C**AETERUM, quod ad alendum infantem attinet, præcipue prodest, si mater suo lacte, infantem alat.

Matris enim lac naturæ infantis & magis conuenit, magisq; proprium est, præterea plus nutrimenti confert, propterea qd partus in utero dum fuit, eidem assuevit, eodemq; nutritus est, Ideoq; cum infans iam magis illud ceu notum & consuetum appetit, Deniq; matris lac infanti salubrius qd. Sufficit aut interdiu bis aut ter infanti mām præbere, ut Auicenna tradit. Quandoq; uitandum est ne ab initio lacte infantem obruamus, qd ita intelligi debet, ne eodem tempore longius lactendo fastidium infanti ingeneremus, Multo enim satius est sæpe

pe ac modice lactare puerum, & immodico lacte semel aut iterum suggestentem opplere. Propterea & qui hoc modo obruuntur, eorum corpora distenduntur & inflantur, lotiumque emittunt, quod imperfectam concoctionem lactis significat.

Quæ quidem si accidunt infanti, abstinere ab alimento aliquanto longius debet, donec iusta fame ad concoquendum impellitur: Similiter si lac matris acrius paulo foret, ieiunare prebere mammam nunquam debet.

At uero, si uel uoletudinis causa, uel quia lac ipsius corruptum & malum foret, ipsa mater infantem nutrire nequeat, nutricem comparare licet, sed tamen eam, quæ hisce rebus prædita sit, Primum ut colore bono, ceruice ualida, pectore autem lato conspicua sit. Deinde ut neque partui propinquior, neque ab eodem longius transgressa sit, ita ut ad summum duos menses postquam eadem peperit elapsi iam sint, ut masculum, si talis modo haberi possit, pepererit. tertio ut sit corpore habito neque gracile tantum, neque nimis crassa ac pinguis. Quarto ut sit proba atque modesta, moribus autem moderatis, neque iracunda, neque seuera nimis, neque etiam formidulosa.

Eiusmodi enim affectiones & perturbationes, perniciosæ sunt, ut quæ lac corrumpant, & unâ cum lacte in mores quoq; & ingenium sugentis transeunt. Neq; enim temere à Poëta additum est, cum ingenium durum atq; immite describere uellet, ut diceret.

Hircanæq; admorunt ubera tygres.  
Propterea cauendum est, ne nutrices fatuas aut lasciuas, ceu sunt indusiariæ, strophariæ & id genus sedentariæ aliæ adhibeantur. V. Nutricem conuenit ubera habere plena & fecunda, quæ neq; mollia aut flaccida sint, neq; tenuitate, aut cōtra magnitudine modum excedāt, aut etiam propter duritiem minus lactis de se prebeant. Postremo lac matricis quoque inspici debet, ne aut nigricans sit, aut cæruleum, aut glaucum, aut rubescens, item ne amarum, aut salsum, aut acidum sit, ne rursum tenue ac fluidum nimis, aut contra crassū ac pingue, sed æquabiliter candidum atque dulce sit. Et in summa illud lac optimum atq; electiss. erit, quod instillatum in modice unguibus digitorum, neq; subsistet & adherere  
bit

bit, si digitum declines ac moueas, neq; defluet si eundem equaliter immotum teneas, nam quod cito effluit, tenue nimis, qd tenatius adheret, spissum nimis ac pingue ducendum est, medium autem inter utrūq; horum optimum.

Quod si forte tum accidat, ut lac matricis calidum nimis atq; acre foret, fugendū infanti dare non debet ieiuna, & anteq; ipsa cibum sumpserit. Fit quoq; interdum ut lac matricis decrescat ac deficiat, id qd uarij sex causis euenire solet.

Aut enim ualeitudine corporis contingit, aut morbo seu uitio uberis, aut frigore & obstructione eiusdem, aut quod ea subtrahuntur, ex quibus lac generari debet, aut deniq; qd fame ac siti nutrix afficiatur, Quæ causæ ut probe quidem cognoscendæ sunt, ita super his medicos consulere, eorūq; ad medicandum opera hoc loco uti decet.

Nos tamen, ut nihil saluti atq; utilitati publicæ deesse pateremur, quædam remedia hic subiunximus, quæ mulieribus hoc malo laborantibus maxime salubria, & ad

aduandum efficaciam putauimus, Proinde ut  
lac nutritis crescat & augeatur, accipe pa-  
stinacam, eiusq; semen aut radicem, nutri-  
ci uescendam prebe, Aut feniculi semen si-  
ue radicem, iure hordei aut cicerculæ de-  
coctam, inter reliqua, quibus uescitur, su-  
mendam dato. Item ubere ouillo unā cum  
eiusdē lacte uesci eodem pdest, Item pdest,  
drachmā lumbrici arefacti & contriti, ex  
lumbricorū terrestriu aqua hordei deco-  
cta sūpsisse. Item accipe butiri vaccini, un-  
ciam, .i. eamq; maceratā, & colliquatā uino  
nutrici bibendam dato. Vtile quoq; erit,  
uentosas sub ubera, cute tamē non incisa  
ad mouere. Item pdest emplastrum ex thu-  
re, Mastiche, ac pice uberibus, aut infra  
impositum cute, prius oleo perunge, ne  
nimis tenaciter illā apprehendat, aut strin-  
gat. Item prodest ubera leniter fricare &  
permulcere, aut in aqua calida, à prandio  
aut cena, inter balneandum, eadem sugen-  
da præbere infanti. Item accipe oleū Lili-  
candidi, aut violæ, in hoc muscum, thus &  
Laudanū contunde ac macera, eoq; liquo-  
re lanam madefactam uberibus, subindē  
inducito

inducito, eademq̃ ita confoueto. Aut rur-  
sum confoueto eodem vino, mentha, rosa,  
viola, & xylō aloë decocto. Item proderit  
uesci iure gallinaceo, cynamomo, Macide,  
cardamomo, & luteo oui temperato. Item  
uesci caseo recēti eadem debet, et lacte, de-  
betq̃ omni labore ac opere magno & diffi-  
cili abstinere. Nec non pulmentaria quoq̃  
ex farina fabali, oryza, ac pane similaceo  
sicco, & lacte ac saccaro, temperata, addito  
etiam semine feniculi aliquanto, ualde pro-  
sunt. Item accipe Anisi, Sileris mōtani, sin-  
gulorum drachmas ternas, cristalli drach-  
mas duas, eaq̃ in puluerem redacta, & alte-  
ro tanto saccari addito, mane, meridie ac  
uesperi circiter decies epotanda dato. Item  
accipe feniculi seminis siue foliorū & Mar-  
rubij manipulos binos, seminis Anisi dra-  
chmas .4. scrupulū unum croci triti, p̃terea  
butiri recētis vncias .3. eaq̃ oīa sufficiēt i aq̃  
decocta in emplastrū redige, ipsumq̃ em-  
plastrū adhuc calidum, pectore nutricis im-  
pone. Item accipe cymini sesquenciā contri-  
ti, idq̃ cū aquæ libris sex, defecati mellis un-  
cijs tribus, in ollā nouā impositū ad tertiā  
partē igne decoquito, decoctū hoc nutrici



bibendum subinde dato. Item accipe Be-  
tæ fatis & bene lotæ, unciam. l. Cymini se-  
miunciam, mellis uncias sex, eaq; contrita  
& macerata inter se, in electuarium redige  
mane ac uesperî singula cochlearia nutri-  
ci absorbenda dato.

Item accipe Cristalli bene contriti dra-  
chmas duas, easq; in partes quattuor diui-  
de, singulasq; partes per dies quattuor ma-  
ne nutritici cum ture ciceris aut pisi sumen-  
das dato. Præterea facundant atq; augment  
lac, hæc quæ sequuntur quoq; Anetum, se-  
men aneti, semen Anisi, Marrubium, Car-  
domomi, caseus recens, ius ex caseo ueteri,  
Cicer, Cristallus tritus & cum melle hau-  
stus, Lactuca, feniculum, uinum in q; ros-  
marinus aut serpillum decoctum fuerit.

Item si nutritix continentior fuerit, Nam  
crebra uenus, exhaurit, & lac insipidum,  
atq; infanti ingratum reddit. Proinde etiã  
lac quod eiusmodi est raro ab infante reti-  
netur aut concoquitur, sed, ut plurimum  
fit, per uomitum rursus egeritur. Cæte-  
rum non inutile fuerit, infantem ut primũ  
natus erit, non suæ matris, sed alterius lac  
primo



primo die fugere, propterea q̄ colostrum,  
ita enim uocant, à partu statim & primo  
die in omnibus otiantibus densatur & ceu  
congelatum erit. Similiter si nutricem e-  
ueniet ex fluxu laborare, aut aluo obstru-  
ctam esse, & ob id medicamenta quæ aluū  
ciant insumpsisse, proderit alteri, dum  
illa conualescat infantem lactandum com-  
mendare.

Porro ubi à lactando puer cubitum re-  
ponitur, & cunarum agitatione somnus  
prouocatur, agitari debet non uolente ac  
duriter, ne lac paulo ante sumptum, eo mo-  
tu in corpore infantis corrumpatur ipsum  
q̄ lædat.

Preberi autem infanti mammam Auic-  
enna per totum biennium iubet, sed no-  
stra consuetudo obtinuit, ut non ultra an-  
num fermè prebeamus. Deinde ubi abla-  
ctare placet, non subito id faciendum est,  
sed paulatim, faciendūq̄ uelut globuli qui-  
dam, aut crustulæ ex pane & saccharo, à qui-  
bus ad consuetudinem ciborum grandio-  
rum puer uelut manu ducatur.

Atq̄ hæc de prima educatione infantis

sufficiant, neq; enim clam me est plura etiam superesse, quæ ad curam huius ætatis pertinent, quo modo tractandi atq; fouendi circa dentitionem pueri sint, de quibus Auicenna non pauca tradit, sed nos breuitatis causa, ea ex alijs petenda atq; discenda lectori relinquimus.

## DE VARIIS MORBIS

*et casibus, in quos recens nati incideresolent, et quo pacto*

*ijsdem succurrendum, Caput ultimum.*  
**S**uperest igitur ut de morbis atq; periculis, quibus recens nati uarie ac passim implicari solent, de eorūq; medicinis dicamus, id enim ultimo loco facturos nos à principio polliciti sumus. Quamuis autem infinita penè sunt mala, quæ huic ætati accidere ab Hyppocrate, Galeno, Rasi, Auicenna, atq; alijs narrantur, nos tamen reliquis ob breuitatem prætermiſſis, ea tantum hic commemorabimus eorūq; curam ac rationem describemus, quæ maxime communia, plurimisq; nota esse uidentur.

Proinde quæ recens natis & infantibus accide-

accidere solent, præcipue hæc sunt.

Exulceratio gingivæ

Fluxus siue concitatio alui.

Astrictio alui.

Spasmus seu distentio nervorum.

Tussis & destillatio.

Difficultas spirandi.

Pustulæ, seu ut uocant, uesicæ linguæ.

Exulceratio oris.

Humor fluens aurium.

Apostema cerebri.

Oculorum tumor.

Oculorum albugo.

Febricula siue calores immodici.

Tormina,

Corpus intumescens & turgidum.

Sternutatio crebra.

Vesiculæ corporis seu papulæ.

Inflammatio testium.

Tumor umbilici.

Insomnia. Singultus.

Nausea siue appetitus uomendi.

Somniorum terror.

Mater puerorū, ita em̃ uocāt morbi

genus

H 4

Procidentia fedis.

Tenasmus.

Tineæ alui.

Intertrigo.

Epilepsia.

Macies.

Tabes.

Paralyfis.

Tremor membrorum.

Calculus.

Oculi strabi.

De horum itaq; cura atq; remedijs ordine deinceps dicemus, ac primū de Exulceratione gingiue, solent enim parua quædam apostemata infantium gingiuis aut circa maxillarum uertebras, cum dentiunt adnasci. Proinde cōtra hæc pdest, gingiuas atq; ipsa ulcera leniter mulceri ac digitis perfricari, deinde adipe gallinarum, cerebro leporis, oleo camomillæ, cum melle aut terebinthina, quæ melle mixta erit abunde ac satis ungi ac collui. Postremo calidam aquam, in qua Camomilla & Anetū decocta fuerint, superne duarum spithamarum altitudine capiti infundi.

De

# DE FLUXU SIVE CON

*citatione alui.*

**Q**uoties infantis aluius concitatio erit fluxuq; tenēbitur, Accipe semen rosæ, siue antheram, ut uocant, Cyminum, Anisum & semen Appij, eaq; omnia contrita & in emplastrum macerata, uentri infantis impone. Quòd si hoc remedio aluius non sistetur, accipe coagulum hœdi, pondere oboli, hoc est, quantum sexta pars drachmę pendet, aut paulo plus, idq; cum aqua frigida absorbendum dato, totumq; eum diem infantem à lacte abstinero, ne haustu in stomacho coëat, sed interea ouorum lutea mediocriter elixa, aut panē similaceū, aqua coctum, aut pulmentum quoq; ex similagine & aqua coctum, pro cibo dato.

Præterea si illud quod excernitur colore flauum erit, sirupum quoq; ex rosa aut malo agrestī, aut malo granato, cum modica aqua menthæ temperatum, bibendum infanti dato. Aliud remedium, Accipe fermentum, & in aqua maceratum ac tritum per pannum colato, deinde sirupum uiolarum pondere oboli, Spodium (hoc ē ebur

combustum) pondere scrupuli, & Gallæ,  
drachmam cum dimidia, unâ omnia tem-  
perata infanti absorbenda prebeto.

Item accipe semen Oxilapatij, id q̃  
contere, & cum assati oui luteo subige, sub  
actum infanti edendum dato. Item accipe  
gallam eamq̃ in puluerem redige, redactâ  
aqua decoque, eaq̃ aqua farina hordeis, aut  
milij subacta, emplastrũ facito, & infantis  
uentri imposito. Quod si hoc nihil profe-  
ceris, accipe præter hæc Acatia et cerussę,  
singulorum drachmā. I. Opij obolũ. I. sac-  
cari drachmam. I. & ex ijs simul tempera-  
tis, pessarium facito lōgitudine sesquidigi-  
tali, crassitudine aut duplicis culmi, & id le-  
di infantis inserito, aluumq̃ sistet.

Rursum si excrementa candicantia sint,  
accipe octauam drachmæ partem ex galla  
muscata, eamq̃ cum succo Cydonij, & thu-  
ris albi scrupulo vno temperatum, pue-  
ro sorbenda dato. Item accipe Croci vinci-  
am, Myrrhæ quadrantem, eaq̃ cū uino ru-  
beo tempera, temperata emplastri modo  
uentri infantis impone. Item accipe farinā  
ex hordeo, eamq̃ cū succo plantaginis, &  
acetī modico subige, subactâ uentri infan-

tis emplastri uice impone. Item accipe Cē  
tinodiæ herbæ succū, & albumen oui, ijsq;  
puluerem rosæ purpureæ, & puluerē Hæ  
matite, mastichen, thus, bolum armenum,  
Sanguinem draconis, & quā uocant psidā,  
simul subige ac macera, & emplastrū inde  
factum, infantis uentri impone.

Item aqua in qua purpureæ rosæ deco-  
ctæ fuerint, infantem lauasse eodem pdest.

Item accipe succum Consolidæ maioris,  
succum plantaginis maioris & minoris, et  
in ijs lutū ē ueteri fornace ademptum, ma-  
cera, maceratumq; emplastri modo corpo-  
ri infantis superimponere.

#### DE ALVO ASTRICTO.

Quod si contrā infantis aluus astrictior,  
neq; egerendo facilis fuerit; suppositorium,  
ex melle conficiendum erit, crassitudine ui-  
delicet culmi duplicis, longitudine autē di-  
giti minimi, idem coquendum, donec con-  
solidetur & indurescat, & ex inde oleo tin-  
ctū, in aluum infantis inferendum. Idem  
confici ex radice caulis bethæ, aut radice  
herbæ eius, quæ Ireos dicitur, mensura ut  
supra, potest, tinctumq; eodem mō inferi,

Item eodem prodest mellis tantū quāta  
ciceris magnitudo est, sumpsisse, corpusq;

leniter demulceri, idemq; lana, oleo humectata abstergi, aut fel bubulum lane implicatum umbilico imponi.

Item prodest nutriti medicamēto, quod aluum ciet, dato, postridie infantē eiusdem uberibus & lacti admouisse.

Item accipe stercoris muris, dimidium drachmæ, idq; cum adipe renis hircini conterere, & ex inde suppositorium ea mensura, quam supra posuimus, confectum, sedi infantis immitte.

Item accipe foliorum Maluę & Altheę singulos manipulos, feni greci & feminis lini singulos manipulos, ibisci uncias duas, ficus decem, hæc omnia, aqua decocta, in mortarium iniice, & contunde, quæ cum pulmenti speciem referent, iisdem butyri, & adipis gallinacei, uncias binas & croci scrupulam unam adde, emplastrumq; inde factum, & linteo, crassitudine culmi inductum, uentri infantis per diem ac noctem tepidum obligato. Quod si aluum hoc non mouebit, Accipe amplius Aloes drachmam. I. Hellebori albi ac nigri singulorum grana quindecim, hæc pariter confusa,



tusa, & in puluerem redacta, succo ebuli,  
aut felle bubulo, mensura trium cochleari  
um subige, ac tempera, eoq; liquore lanam  
tinctam atq; humectatam, Vmbilico infan  
tis, latam palmam impone atq; obliga.

Item accipe succum ebuli, & farinam  
molendini, quod uocant, ex ijs pulmētum  
coque, coctum linteo crassitudine pennæ  
inductum, emplastri modo umbilico & in  
fra ita ut stomachum non contingat, infan  
ti impone.

Item accipe rosæ purpureæ, manipulos  
duos, eosq; sacco quattuor digitos lato in  
ditos aqua ea qua fabri cādens ferrum ex  
tinguere solent, addito nonnihil acetī, de  
coque, deinde sacculum expressum infan  
tis stomacho super impone.

Item butyrum iuglandis calici seu testæ  
infusum, infantis vmbilico illiga. Quancq;  
et toti uentri butyrum illitum et inunctū  
non parum ad hanc rem conducit.

#### C O N T R A S P A S M V M.

**A**T si quando contingat, ut infans mor  
bo, quem Spasmon uocant, torqueatur, id  
quod plerumq; fit, ex mala concoctione,  
aut

aut imbecillitate attrahentium ; præcipue pueris paulo pinguioribus, & vuidis existentibus, perungendus infans est oleo lilij, eius quod uiolam colore refert, aut etiam oleo candidi lilij, aut oleo de Reni, ut vulgo appellant. Atque hic, si spasmus infantem corripit, tunc cum membra ceu sunt brahia & pedes, protendit & ab se proijcit (quæ le inter osciandum fermè fieri solet) aqua, in qua Tabſus barbatus, ut dicitur, decoctus fuerit, lauari ac balneari infans debet, aut oleo uiolæ, & oleo amigdali dulcis, utroque inter se mixto ac temperato, perungi. Quod si calor uehementior erit, oliuo simplici, aut oleo uiolæ, cum cæra alba modica temperato, laborantem perunge, capiti quoque oleum uiolæ infunde.

#### C O N T R A T U S S I M

*ſeu deſtillationem.*

Nonnunquam uehementior quoque tuſſis infantes infeſtat, deſtillationeſque ex capite, in naſum, os, ac pectus descendunt, quod ubi fiet, hoc modo ſubueniendum affectiſ ac laborantibus erit.

Capiti infantis ſuperne, ex alto duarum ſpithamarum, aquam calidam infunde,

*idque*

idq̃ per mediam horam continue fac, lingua eiusdem interea melle colluta & inuncta. Postea, inserta leniter manu, aut instrumento aliquo, linguae interiorē imāq̃ partem modice deprime, ut ex eo uomitur concito, crassos atq̃ uiscosos humores, quibus tum abundat infans, emoueat expuatq̃, eoq̃ facto conualeſcet.

Aut accipe gummi arabicum, gummi Tragachantum, semen Cydonij, succum Glycyrrhizæ, & saccharum penidii, eaq̃ simul contusa, puero quottidie cū lacte recens mulcta, modice absorbenda dato.

Item accipe nucleos amygdalæ dulcis, eosq̃ deglube primum, deinde in mortario contunde, contusos cum succo feniculi, aut aqua eiusdem decoque, decoctumq̃ mane ac uesperī infanti bibendum præbe.

Item eodem prodest aqua marathri, cū lacte temperata, & epota. Quod si tussis palatum & linguam infantis exasperasset, accipe seminis Cydonij duo cochlearia modice contusa, eaq̃ per horas duas aut tres calida aq̃ macerari sine, deinde ex maceratis uiscosi-

uiscositatem & crassum humorem exprime per cotum, & quod reliquum est, cum saccharo penidio, & oleo amygdalę dulcis defrigi ad focū in sartagine facito, & inde in electuarium redactum, subinde infanti sorbendum dato. Et si calor cū tussi ingrauesceret, electuario huic, succum granati dulcis affundito.

Item contra tussim & calorem, accipe papaueris candidi & dragaganti, quod dicitur drachmas binas, granorum cucurbitę strictorum drachmas quatuor, eaq; omnia bene contusa, cum aqua in qua sebastę aut vuę passę decoctę fuerint, tempera, & puero subinde sorbenda dato.

Item accipe passulas & exempto semine eas in sartagine seu cacabo ferreo, cū aqua decoque, ita tamen ne quid eorum igne superante torreatur. Exinde à foco remotas in mortario probe contunde, & cum saccharo penidio subige, & magnitudine iuglandis mane ac uesperı sorbendas infanti dato.

Rursum si tussis ex materia frigida prouenisset, accipe aliquantum myrrhę contritę

tritæ, & cū melle eliquato, & olei amygdalæ dulcis, aliquanto subige ac tempera, atque inde infanti sumendam præbe.

Præterea nutricem quoque oportet omnia ea uitare, quæ tussim mouent ac generant, ut sunt acetum, cibi nimium salsi, nuges, & omnia acria. Eadem quoque infantis pectus butiro, & eo quod dialtheas uocāt, perungere debet.

Item contra tussim, accipe Acinos, seu uuas passas, easque in sartagine frictas, contunde, & exinde adde tantundem saccari penidij, cum oleo uiolarum aliquanto, & electuarium inde factum liquidum, subinde infanti magnitudine auellanæ sorbendum præbe.

#### CONTRA DIFFICVL=

*tatem spirandi.*

**A**ccidit infantibus difficultas spirandi quoque, quam græci dyspnæcem uocant. Ad hanc subleuandam, accipe semen lini, & id contritum melle tempera, & subinde infanti dato. Quod si morbus ingrauescat, & præcordia obstruatur, aures & quæ circum aures sunt, oliuo bene atque ab

unde perungito, nec non linguam quoq;  
ut uomitus cieatur, præterea aquam cali-  
dam in os instillato, & aliquantum semi-  
nis lini contriti, & cum melle temperati, &  
in modum electuarij subacto, edendū dato.

Aliud medicamentum, Accipe cotum  
seu semina ea, quæ lanæ inuoluta reperi-  
untur, eaq; contusa, cum assati ouiluteo, in-  
fanti sorbenda dato. Quòd si ad difficulta-  
tem spirandi accessit fluxus uentris, sorben-  
dum dato syrupum Myrtinum, cum mel-  
le coctum, aut dactylos cum lacte & farina  
tritici coctos.

#### C O N T R A P U S T U L A S

**A** seu (ut uocant) nescias linguæ.  
Accidit infantibus quoq;, ut pustulæ  
illius linguæ innascantur & ori, quod qui-  
dem ex acrimonia lactis prouenit, ore ac  
lingua infantum ita teneris ac mollib. ut le-  
ui aliquo contactu offendantur. Proinde  
periculosum quoq; infantibus est, præter-  
q; qd molestum, lactis acredine ita inuri,  
Nam expustulis, quæ immaturæ sunt, &  
nigrescunt, eedem lethales plerunq; sunt,  
quæ aut albæ sunt aut flauescunt, et minus  
pericu

periculi habet. Aduersus malū igitur hoc, accipe uíolas contritas, atq; ori infantis impone. Aut accipe uíolas, rosas, & quę xylo caracta uocant, simulq; trita omnia, pustulis offunde. Item accipe succum lactucae, succum solatri, & succum portulacae, quae ubi simul cōmiscueris, & inter se temperaueris, pustulis infantis illine. Quod si pustulae nigrescerent, adde praedictis glycyrrhizam contusam. Rursum si eadem humidae fuerint, accipe myrrham, gallam, & corticem thuris, eaq; bene trita, ac melle temperata, linguae infantis illine.

Item accipe succum mori austeri, aut ex uuis immaturis expressum, quod agreste uocant, eoq; linguam inunge.

Item proderit pustulas uino ablui & uelut detergi, postea galle, aut corticis thuris puluerem tritum, inspergi.

Quod si remedio praesentiori & acriore uti uoles, accipe Boli Armeni, Psidae, & Sumach, singulorū drachmas ternas, praeterea galle drachmas duas, aluminis drach

mam unam, hæc omnia cōtusa & trita cri-  
bro percolato, eumq̃ puluerem pustulis  
inspergito.

Rursum si pustulæ hæ rufescunt, mul-  
toq̃ sputo os replent, nutricis erit humidis  
atq̃ frigidis uesci, deinde lentes per bene  
commanducatas, ori infantis ac linguæ im-  
ponere.

Item eodem confert amyllum, aqua ro-  
sarum maceratum & subactum, linguæq̃  
infantis impositum.

Item succus granatorum, succus Cydo-  
niorum, aut succus malorum macianorū,  
eodem modo impositus linguæ, prodest.

Rursum si pustulæ flauescunt, tunc su-  
perioribus succis, misce succum lactucæ q̃-  
q̃, & succum portulacæ. Postremo si can-  
dicant eadem, accipe myrrhæ & croci sin-  
gulas drachmas, sacchari aut candidi dra-  
chmas duas, ijsq̃ in puluerem reductis pu-  
stulas ac linguam infantis consperge.

#### EXULCERATIO SEV

**F**issuræ oris.  
It quoq̃ propter duritiem papillarū  
nutricis, ut nonnunq̃ labia, aut os infantis  
exul-



exulceretur, & uelut fissuris quibusdam  
distringatur, quod cum factum est, accipe  
lanam purgatam, seu ut nostra uocat ling  
ua, tractam, eamq̃ succo plantaginis, aut  
butyro non cocto, aut recenti adipi gallina  
ceo, & ijs omnibus calidis, intincta atq̃ ma  
defacta, infantis os ac labia inunge.

A P O S T E M A T A A V =

*rium, & humor fluens.*

**I**Nterdum aures quoq̃ infantium humo  
re fluunt, id quod ex abundanti corporis hu  
more, et p̃cipue cerebri, provenire solet.

Proinde malum hoc sic curabis, accipe  
lanam, eamq̃ melle cum uino rubeo mix  
to, & item aluminis triti aut croci modico  
temperato, humecta, deinde ex eadem, ue  
lut quoddam pessarium aut liciniam factā  
in aures infantis inferere, & cum lana humo  
rem & sordes quæ in aure sunt, attraxerit,  
eandem ex aure exime, aliamq̃ nouam &  
recentem in locum reponere. Quod si hu  
mor qui ex aure manat, purulentus fuerit,  
accipe mel coctum, & aqua temperatum,  
in aurem immitte.

Aut accipe gallam tritam, eamq̃ aceto

temperatam, eodem modo adhibe. Rursum si dolor aurium, ex flatu ac uentositate & humore proueniet, coquendum erit origanum, uel myrrha, cum oliuo, & coctum in aures tepidum instillandum.

#### A P O S T E M A

*cerebri.*

**A**T uero si cerebro infantis apostema aliquod inflammatum (ut sit nonnunquam) nascatur, & ex eo fauces aut oculi dolore uexantur, aciesque pallere aut flauescere incipit, tum ea adhibenda erunt, quae cerebrum refrigerent & humectent, hoc modo.

Accipe cucurbitae solatri, & portulacae succos, iisque oleo rosarum temperatis, lana intinge & humecta, humectatam capiti infantis impone, & quoties exiccata eadem fuerit, recentem et madefactam aliam, priore ablata, in locum repone.

**C**O C V L O R V M T V M O R.  
Contra oculorum tumorem, accipe Licium, id succi genus est & lacte muliebri temperatum, oculis impone, tenerisque lintheis obliga, postea oculos ipsos, aqua, cum qua Camomilla & basilicon, cocta fuerint, abluere

abluere. Quod si aut inter tumescendū oculi ipsi nō rubescāt, neq; frons inflammata foret, accipe myrrhā, aloē, crocū, & rosarū folia, eaq; simul uīno ueteri tempata & subacta, tenero aliq; linteo oculis illiga, narib. autem impone ambræ aliquantum, lacte muliebri subactum.

**C**ALBUGO OCULORVM.  
Contra albuginē oculorū, q̄ plerunq; ex nimio fletu infantib. oritur, succū solatri oculis instilla. Et si fore ex eadem causā oculorū venæ rubore, scabie et tumore suffunderentur, eodē solatri succo, eas inūge.

**C O N T R A I M M O D I C O S**

*calores seu febriculas.*

**S**I uero infanti calores immodici & præternaturam (quā latini febrim appellāt) accidat. Nutricis primum officium erit, ijs uesci, quæ refrigerant & humectant, deinde infanti danda hæc, succus mali granati, aqua cucurbitæ, saccaro, & camphorę aliquanto, temperata.

Proderit item ad sudandum infantem prouocare.

Item accipe farinam hordei, eamque

absynthij, plantaginis, maluæ, & semper-  
uiuæ, siue sedi, succis inter se mixtis subi-  
ge, ex quo emplastrum factum, pectori in-  
fantis impone.

Item perunge frontem infantis oleo ro-  
sarum, admixto populeo unguento, simili-  
ter & tempora & brachia, & manus circa  
arteriæ pulsum, & pedes circa talos, eo-  
dem unguento, & eo egelido, inunge.

Item accipe farinam hordei, rosas ariz-  
das, & in puluerem redactas, easq; simul  
cum aqua rosarum, & aqua Endiuïæ tem-  
peratas subige, & inde emplastrum factū,  
corpori infantis impone.

Præterea quoties infans lauabitur, ea a-  
qua lauetur, cum qua coctæ fuerint quæ  
cunq; infrigidant, ut sunt lactuca, portula-  
ca, Endiuïa, Epatica, plātago. & id genus.

#### C O N T R A T O R M I N A

*uentris.*

**A**T si infans torminibus uentris labo-  
ret, id quod ex eo deprehenditur, cum &  
plorat immodice, & cū clamore in latera,  
nūc huc, nunc illuc se iactat. Fouendus  
est uenter imposita lana, quæ calida aqua,  
oliuo

oliuo & ceræ modico humectata fuerit.

C O R P V S I N T V M E =

*scens ac turgidum.*

**Q** Vòd si infans toto corpore, aut aliqua eius parte intumescat, accipe Sambuci atq; Ebuli cymas siue summitates, & decoctas uino albo, infanti circumuolue, præsertim, si magno calore non inflammetur.

At si cum dolore capitis uenter turgescat quoq; tunc accipe myrrham, aloen, Epaticum & crocum, eaq; simul contusa, fabarum succo tempera, capitiq; infantis impone.

S T E R N U T A T I O

*crebra.*

**I** Nterdum accidit infantibus, ut crebra sternutatione infestentur, cuius rei causa siest apostema cerebri, imponenda capiti eiusea sunt, quæ refrigerant, siue ex oleo, siue unguento, siue succo & cæteris id genus. At si ex alia causa nō ex apostemate hoc malum prouenerit, Basilicum conterere, siue siccum siue uiride erit, contritumq; naribus infantis insere. Quod si sternutatio hæc cum calore inciperet, oculiq; infan

tis, quasi retro celsisse uiderentur, tum capiti eius folia portulacæ impone, aut cucurbitam tenuiter rasam, cum rosarum oleo, & farina hordei temperatā, addito etiam uitello ouī.

## PAPULAE QVAS CVTIS

*uesiculas uocant.*

**P**apulæ in corpore infantis, si nigrescūt lethale est, quo magis periculosum erit, si eedē frequentes et crebæ fuerint. At si candicant, minus periculi portendunt, pueroq; conualescere licet. Itidem, si rufescant.

Proinde accipe folia rosæ rubentis, folia myrti, & tamarisci, eaq; cum aqua coque, et linteum aqua, in qua decocta fuerint madefactum, papulis infantis impone.

Item ungere infantem oleo rosarum, myrti, ac tamarisci, eodem modo prodest. Quod si papulæ candicent, aut rufescant, sine primum ut maturescant, & postq; maturuerint, tū demum curam adhibe. Suppurascentibus autem illis, & iam apertis, ungentum cerussæ, inunge.

Nec non proderit papulas, mulsa aqua, Hydromelle, in quo uitrum maceratum

ac tem

ac temperatum fuerit, collui. Nec ignoro,  
plura in hunc usum remedia ab Auicenna  
tradi, q̄ tum si quis uolet, ex eo petat, nos  
em̄ pro modo huius libelli, satis habemus  
unum atq; alterum, & quod conferre max  
ime usum erat, huc apposuisse.

## TUMOR INGVINVM

*uel inflammatio testium.*

**C**Aeterum accidit interdū infantibus,  
ut ex nimio ploratu circa inguina, & in in  
teriore parte feminū intumescāt, nōnunq̄  
etiam rumpantur. Aduersus hęc accipe se  
men, q̄ nostri Ameos dicunt, cōtritū, & lu  
teo oui temperatum, tumori aut rupturæ  
imponere, impositumq; tenui aliq̄ linteo obli  
ga. Aut si magis placet, accipe Lupinos a  
maros, uinoq; maceratos, addita myrrha,  
eidem uino incoque, & emplastrum inde  
factū, tumori ac læsæ parti impone. Aliud  
remedium. Accipe aluminis drachmas. 15.  
gallæ drachmas vndecim, contusa simul  
cum uino rubeo decoque, eò usq; donec in  
crassum liquorē redigantur, quem deinde  
rupturæ



rupturæ siue ramicibus, ut latini uocant, impone, super imposita spongia quoq̃, aceto aqua mixto, humectata, ac subinde, cum defluit renouata. Quanc̃ poteris idem decoctum cum glutino ex coriorum præseminibus cocto, lintheo inducere siue illine re, illudq̃ postea affectæ parti obligare, & idem quoties defluit renouare.

**A** T V M O R V M B I L I C I.  
Accidit item infantibus, ut vmbilicus tumore suffundatur, præsertim tunc, cum à partu refecatur. Contra hunc igitur tumorem accipe Spicam Celticam, quã vulgus magdalenæ florem appellat, quam etiam lixiuio imponunt, & addito oleo Seseamī, cum Terebinthina, ad focum decoque, postea in decocto lanā humectatam, crassitudine digitulī, vmbilico infantis impone.

At si infantis vmbilicus ex nimio ploratu, aut tussi, aut iactu, ictuue itumuisse, aduersus hoc accipe lupinos, & puluerem ex linteis puris ac ueteribus concrematis, redactum, eaq̃ cum uino rubeo temperata, & cāabinæ (ut sic loquar) stupæ, infusam siue illitam, vmbilico impone.

Insom-



## I N S O M N I A.

**C**ontra insomniam, hoc est, cū infans suo ac legitimo somno destitutus, tempus omne uagiendo terit, accipe caules papaueris aut calículos eiusdem, unā cum semine, & addito oleo lactucae, oleoq; papaueris, inter se omnia temperata, fronti atq; temporibus infantis fasciā aliqua tenui, illiga.

Quod si talis insomniā, ut sit interdum, ex lactis quod ex nutrice fugit, impuritate accidat, Accipe oleum uiolarum, & addito aceti modico, naribus infantis subinde instilla. Aut accipe oleum rosarum, succo lactucae temperatum, eoq; caput infantis perunge & stomachum. Præterea cura, ut nutriticis lac melius reddatur.

Item syrupum accipe, ex papauere albo temperatum, & infanti sorbendum da, frontem autem & tempora oleo uiolarū, in quo Croci aliquantum & opium intrita erunt, inunge.

## S I N G V L T V S.

**C**ontra singultum accipe nucem indicam, eamq; tritam, & saccharo temperatā, infanti edendam dato.

Acci=

Accidit autem singultus, uel ex nimio cibo, uel ex defectu cibi, & inanitate stomachi. Itaque ex abundantia cibi, aut frigide stomachi quoties prouenerit, stomachum oleo laurino calefacto, inungi conueniet, aut emplastrum ex aneti semine, trito & succo menthæ, temperatum calidum, stomacho super impone. Rursum si ex carentia cibi & stomacho famelico singultus oritur, accipe oleum uiolearum, aut rosarum, aut etiam succum Endiuia, seu aliarum herbarum, quæ vim infrigidandi habent, eaque laetemuliebris temperata, stomacho inunge.

Lac quoque & alia suauia & utilia bibenda eidem prebe. Neque te moueat, si reijciat etiam per uomitum, quæ absorbenda dederis, Nam semper tantum remanebit, quantum ad stomachum fouendum atque humectandum satis erit.

#### N A V S E A S I V E A P =

*petitus uomendi.*

Contra nimiam uomendi appetentiam gariophilorum tritorum, quaterna grana infanti sumenda prebe.

Item accipe mastiches, thuris candidi,  
& foli

& foliorum rubentis rosæ, quantum satis iudicaueris, eaq; omnia trita, & succo menthæ temperata in emplastrum redige, idq; stomacho infantis impone. & si vomitio hæc crebrior, & ualidior erit, supradictis acetū non nihil admisce.

Aliter, Accipe similam candidam, eam q; torre, donec ruffescat, deinde contusam rursum aceto immitte, additosq; ouorum uitello duro cocto, Mastiche, thure, & gūmi arabico, omnia inter se subige, ac succo menthæ temperata, in emplastrum redige, idq; stomachi orificio infantis impone.

Ori autem eiusdem tostum seu recalcitum panem oppone. Causæ autem huius mali tres ferre sunt, prima, si plus sugendo lactis infans hauserit, quam concoquere potest.

Altera, si lac nutricis tenue, aquosum, humidū et fluidum. nimis ē. Tertia, si idem lac impurum ac feculentū, & ex his causis præcipue uomitus mouetur, si accidit stomachus imbecillis ac humidus. Itaq; infanti  
hisra

his rationibus medicari oportet. Primum ut minus q̃ ante sugendū prebeās, lacteq̃ pro modo abstineas. Deinde ut id quod reijcitur obserues, an acetum redoleat, & an candicet. Nam si hoc fit, accipe candidi thuris grana octo, rutæ aridæ grana viginti, eaq̃ trita & temperata cum syrupo rosarum rubentium, puero sorbenda dato.

Aut nutritici cuminum dato, quod comēdandū puero in os inserat, atq̃ illinat. Prodest et sirupum granatorum, cum puluere menthæ tritæ, infanti datum.

Item accipe xylo aloës, drachmam vnam, mastiches drachmæ dimidium, Gallæ grana decem, eaq̃ trita, et syrupo rosaceo temperata, addita galla muscata, infanti ante lactandum subinde sorbenda dato. Stomacho præterea emplastrum hoc quod sequitur impone. Accipe Mastiches, Accatiæ, Xylo aloes, gallæ, thuris candidi, tosti panis, singulorum pondus par, eaq̃ contrita unâ cū rosis rubentibus & syrupo rosarū temperata, stomacho infantis impone.

Rursum autem si id quod uomitu reijciatur, non oleret acetum, sed aliud quippiam

am acerbum, neq; etiam colore candicans,  
sed pallescens magis foret, tunc infanti suc-  
cum agrestis, quod dicitur, aut succum Ci-  
doniorum, hauriendum prebe.

Emplastrum autem huius generis adhi-  
be. Accipe farinam hordei, summitates seu  
cymas mori agrestis, seu, ut vulgo uocant,  
morobacci, et psidam hoc est corticem ma-  
li granati, & hæc omnia simul contrita, &  
aqua rosarum temperata, stomachi infan-  
tis impone.

Præterea si stomachus infantis foret hu-  
midior, & minus concoquens, perũge eun-  
dem foris aqua rosarum, in qua muscus tri-  
tus sit, aut aqua Myrti, bibendum autem  
prebe succum cydoniorum, cum modico  
gariophilorum, et saccari, aut gallæ musca-  
tæ scrupulo temperatum & mixtum.

#### INSOMNIA TERRIFICA.

**N**Ecnon terrifica insomnia infantes in-  
terdum inquietare solent, quæ plerũq; ex  
abundantia alimentorum seu cibi proueni-  
unt, ea sic procurari debent. Principio ca-  
ue ne statim à cibo cubitum infantem re-

K

ponas, deinde aliquantum mellis, lingen-  
dum prebe, quo ea quæ concocti difficili-  
ora sunt, facilius concoquantur, & deinde  
cætera ad aluum & incrementa cogantur.

Item quottidie infanti septuncem drach-  
mæ, eius electuarij, quod diamuscum, aut  
diaplrîs uocant, sorbendum prebe. Theri-  
aca quoq; non parum hoc loco prodest,  
cum lacte sumpta, ut Rasis quoq; probat.

**E** M A T E R P V E O R V M.  
St præterea morbus, quæ puerorum  
mater vulgari nomine uocatur, quæ non  
nihil cum Epilepsia cômune habet, & in-  
fantes plerunq; cum lactantur infestat.  
Cuius signa sunt hæc, frequens ploratus,  
terror inter dormiendum, vigiliæ, calores  
immodici, & foetens anima.

Prouenitq; etiam hic ex imperfecta con-  
coctione, cum lactis plus infanti quàm con-  
coquere potest, prebetur.

Itaq; cum huic succurrere uoles, primum  
cura ut lac nutriticis emendetur, quo facili-  
us concoqui possit, deinde Electuarij eius,  
quod

quod diamuscum uocāt, aut diapliris, quos  
tidie iufanti scrupulum dimidium dato.

Inprimis autem confert, theriaca cum  
lacte sumpta.

## ASTHMA, RAVCEDO,

*sive stridor animæ.*

**S**Vperius de difficultate spirandi, & q̃-  
modo eadem curanda sit, diximus. Sed ea-  
dem illa interdum ita increfcit, ut infans in  
fomno quoq; ægre, & non nifi cum fonitu  
ac stridore quodam anhelet.

Quod cum accidet, ita medicandum e-  
rit. Accipe lini semen bene tritum, ac mel-  
le despumato temperatum, ori infantis  
subinde illine.

Quod si color mediocris erit, accipe cu-  
minum tritum, & melle despumato, tem-  
peratum, eodem modo adhibe.

## PROCIDENTIA

*sedis.*

**C**ontra procidentiam sedis, hoc est,  
cū os intestini inter connectendum se emo-  
uet, accipe psidiæ, myrti, caliculorū glādis,  
foliorū rubentis aridæ rose, cornus ceruini

combusti aluminis, vngulae caprinae, ba-  
laustiae, hoc est floris granati, & gallae, sin-  
gulorum pondus par, eaque omnia cum aq  
decoque tam diu, donec aqua vires deco-  
ctorum attrahat, & in eadem aqua tepida  
infantem laua.

#### T E N A S M V S.

**Q** Valis morbus Tenasmus sit supra di-  
ximus, is igitur infantibus quod interdum  
accidit, & plerumque ex frigidityte, contra  
quem his remedijs utere. Accipe Nasturtij  
hortensis, et cumini seminis, singulorum po-  
dus aequale, idque tritum et temperatum bu-  
tiro ueteri, cum aqua frigida bibendum pre-  
be. Aliter, accipe Terebinthinam, eaque car-  
bonibus imposita, fumum qui inde oritur,  
sede infantis excipe, caeteris circum circa  
obturatis.

Item accipe colophoniam picem, eaque  
carbonibus imposita, suffitu anum infantis  
ut supra, confoue.

#### T I N E A E A L V I.

**I**nnascuntur & tinea aluo siue intesti-  
no infantis recto, magnitudine uidelicet ea-  
rum quae ueteribus casu innasci solent.

Inna



Inna scuntur item & alia in uentre, magnitudine lumbricorum. Contra has igitur hæc remedia profunt. Accipe graminis aquam, siue ut alij uolunt, aquam proserpinatæ, eamq; cum lacte potandam infanti prebe. Aut sic, accipe corallij candicatis, rasuræ eboris, cornus ceruini combusti & Iryi, singulorum scrupulos singulos, sacchari candidi vncias duas & semi, aquæ graminis, seu ut alij centinodiæ, quantum ad temperanda illa sufficit, & ex ijs omnibus subactis suppositoria cōfice, et infanti quotidie pondere drachmarum duarum adhibe. Aliter, secundum Rasim, Accipe Cuminum triti, & felle bubulo temperati, quantum satis uidebitur, & inde emplastrum factum, umbilico infantis impone.

Item oleum oliuorum sumptum, contra omnis generis tineas prodest, easq; necat.

Item contra tineas minores ani, accipe coti lanam teneriorem, & ex eadem suppositoria confice, quæ oleo absynthij, aut rutæ, aut nucleorum persicorum, aut etiam amygdalæ amaræ, intincta, sedi infantis insere. Prodest item infantem lauaria aqua.

cum qua folia perfici, & absynthium cocta fuerint. Vngentum ad eundem usum. Accipe absynthij, lupini, singulorum binas drachmas, Sileris montani, cumini, nigellæ, centaureæ, centonici, cornus ceruini cōbusti, singulorum drachmas. 4. eaq; omnia trita, & oleo Absynthij, aut Amygdalæ amaræ, pondere duarum vnciarum additis ceræ drachmis. 4. temperata, in ungētum redige, ipsoq; apud focum, aut aliās in loco calido, infantis uentrem & corpus perunge.

Aliud eòdem. Accipe nigellæ drachmas duas, absinthij, mastiches, singulorum drachmam. 1. aloës, corallij rubri, singulorum drachmas. 2. coriandri præparati, drachmas. 6. eaq; omnia bene trita, & cum farine filiginis, vncijs tribus, lupinorum tritorum drachmis sex, & croci drachma vna, additis succo rutæ, pondere vnciarū 2. aut si hic desit, oleo rutæ, ponderis eiusdem, & succi absyntij, vncijs quatuor, aut si succus desit, oleo absynthij, pondere parī, temperata, in emplastri modum redige, idq; vmbilico infantis, spatio palmæ impone.

Aliter

Aliter, præcipue contra maiores tineas, quos lumbricos hodie appellant, hoc mō. Accipe succi absynthij, & fellis bubuli vncias binas, Colocynthidos, drachm. s. ij. scq; tritis & subactis, emplastrum addito farinæ tritici modico, confice, idq; vmbilico infantis impone.

Balneum quoq; contra tineas, hoc modo apparabis, absynthium & gallam, quantum pro modo satis erit, cum aqua decoque, eaq; aqua infantem usq; ad vmbilicū insidentem, calida laua.

**C** I N T E R T R I G O.  
Contra intertriginem, hoc est, cum membra et cutis infantis, acrimonia lotij interteruntur, accipe myrtum tritum, eumq; affectæ parti asperge.

Aut accipe Iryon, rosæ rubentis, Cyperi aut Tragachanti, quantum p modo morbi sufficiet, eaq; uel singula, vel omnia simul contrita, affectæ parti insperge. Item accipe olei rosarum vnciam vnam, thuris cā didi drachmam vnam, his colliquatis, adde camphoræ, prius aq; rosarū maceratæ

& liquefactæ, grana octo, unguentoq; inde facto, loca infantis uiciata, inunge.

Eodem profunt, vnguentum, quod uocant album, siue cerussæ, & vnguentum rubeum.

## EPILEPSIA SEV

*morbus Comitialis.*

**C**omitiali quoq; morbo infestantur infantes, & hoc duobus modis. Aut enim simul cum partu agnascitur morbus, & ex frigidityte, & malis humoribus cerebri, causam trahit. Aut post partum ex accidentibus causis accidit, in quo casu idem si ante uigesimalium quintum annum masculum, puellam uero circa temporis illud, quo menses primum mouentur, non deserat, neq; etiam intra id spacium ætatis, siue naturæ potestate, siue medicamentis auerti, & curari possit, periculum est, ut per omnem ætatem uitæ, seu masculus seu puella illa, fuerit, eo non liberetur.

Proinde si vnà cum morbo infans natus fuerit, curandum est, ut eo cibo sustentetur & alatur, qui & ætati ei conueniat, & suo tempore prebeatur, deinde qui calidus  
& sic

et siccus natura sit, cuiusmōi et ipsa nutrix  
uti debet. Rursum si nō natura, sed ex acci  
dēte aliq̃ morbus idem prouenerit, danda  
opera est, ut lac nutricis bonum, atq; natu  
ræ quàm maxime conueniens sit. Atq; e  
am ob rem, si necessitas postulare uidebi  
tur, nutricis caput medicamentis idoneis  
& debitis purgari quoq; non inutile ac præ  
ter rem erit, Eademq; uitare debet, omnia  
quæ infrigidant, & infanti lac prebere, nō  
ultra quàm facile concoqui potest. Præte  
rea in nares infantis subinde instillanda e  
runt, oleum castorei, oleum costi, aut oleū  
Euforbi, adhibendaq; iisdem odoris caus  
sa, Ruta, & Asa foetida. Collo autem adne  
ctenda semina & radices pæoniæ, luna de  
crescente decerptæ & effossæ, Et theria  
ca quoq; si necessitas amplius poscat, potu  
danda est.

Item prodest infanti dare coagulum le  
poris cū aqua mulsa, quo tamen sumpto eo  
die abstinendum eidem à lacte & fugen  
do erit.

Item collo infantis suspende uiscū quer  
cinum, qui mense martio & decrescente lu

na decerptus sit. Nec non alia plura quoq;  
eodem conferunt, sed nos breuitatis grati-  
a, quæ potissimum uidebantur, ea tantum  
adscriptimus.

T A B E S S E V M A.

*ties immodica.*

**A**T quoties infans ita decrescit, ut ossa  
cutem trahant, ex qua re etiam in languo-  
rem & ægritudinem incidit, lauacro uten-  
dum est, ex aqua, cum qua caput & pedes  
arietis cocta, eò usq; fuerint, donec caro ab  
ossibus ultrò ac sponte abscedat, seseq; resol-  
uat. Et ex hoc lauacro, quoties infans exit,  
(sæpius eĩ eo lauari debet) abstergendus  
est primum accurate, deinde ungēdus hoc  
quod sequitur ungento. Accipe butyri  
non cocti, siue recentis, olei uiolarum, aut  
rosæ, singulorum drachmas binas, axungi  
æ drachmas sex, Ceræ candidæ drachmas  
quatuor, eaq; omnia simul colliquata, in un-  
gentum refer, eoq; ut diximus, à balneo ue-  
tere. Vngentum aliud. Accipe ceram cā-  
didam, axūgiā, seu ū ouis, butyrū recens,  
hæc omnia in uase carbonib. imposito colli-  
quata, decolata, & in unguētī speciem re-  
ducta, ut suprà.

*Lassē*

## **I** Laffitudo membrorum.

**I**Nterdum fit, ut infantis membra Paralytico more langueant, suumq; offitium destituant, ita ut neq; manus & brachia attolli, neq; pedes incedere ualeant. Proinde si hoc accadat eo tempore cum adhuc mamma infantī datur, confortanda atq; firmanda nutrix est, ijs medicinis, quæ calefaciūt, atq; siccant. Eademq; cibo uti debet ut plurimum assato aut fricto, à lacte uero & piscib. item carne crassa & indurata sale, prorsum abstinere.

Præterea nec uino uti debet diluto ac mixto, infantemq; priusquam lactetur, lauare, & deinde oleo Castorei, aut costi perungere. Cui etiam quotidie ex hoc Electuario, quod sequitur, aliquantum sorbendum dari, non inutile erit.

Accipe Mentaſtri, Cinnamomi, Cuminī, foliorum Rosæ aridæ, Mastiches, Fœni græci, Valerianæ, Præterea Amei Doronici, ut uocant, Zedoarię, gariophylli, Sandali, Xiloaloës, singulas drachmas, musci



musci autem drachmæ dimidium, his omnibus simul tritis & melle despumato subactis, electuarium confice, & ex eo quottidie infanti laboranti quadrantem drachmæ sorbendum dato. Quod si infans omnibus membris deficiat, accipe ceræ vnicam, et drachmam unam Euforbij, eaq; subacta, & temperata cum oleo olivæ, emplastrum modo, spinæ infantis impone.

**T** R E M O R A R T V V M.  
Remor artuum si infanti accadat, periculū ne contrahatur membris, et Epilepsia corripiatur, proinde venienti malo ita succurrendum est. Accipe oleum rosarū, & oleum Nardī, ijsq; simul mixtis ac calide temperatis, spinam infantis & item cætera membra quæ tremunt, perunge.

Quamvis idem etiam alio oleo, quod calefaciat, ut est laurinum, fieri potest.

Quod si hac medicina nihil proficies, medicos ulterius consule.

**C** A L C V L V S.  
Præterea si infans calculo, aut alia quamurinae, ac eius meatuum obstructione laborat, id quod ex his signis deprehenditur



ditur, si stranguria uexatur, si sæpe urinã  
ciet, modice tamen, et non nisi cum difficul-  
tate ac dolore emittit, si ipsa urina diluta et  
clara, & in masculo membrum laboran-  
ti assiduo arrigitur, tunc in hunc modum  
subueniri debet. Principio in aqua, cum  
qua malua, Ibiscus, semen lini, paritaria co-  
cta erunt, infantem lauato, deinde sorben-  
dum aliquid dato, quod urinam ciet, pro-  
mouet, postremo, quando cubitum repo-  
netur, eundem oleo circum genitalia inun-  
gito, & aquam morobaccorum, cum lacte  
potandum dato. Aut aliter, accipe sangui-  
nem hirci, & scorpionis cremati puluerẽ,  
eacq; unã cum oleo scorpionum, aut oleo li-  
lij candidi, subacta & temperata, empla-  
stri modo, infantis corpori, supra genitalia  
imponere.

**P** O C V L I S T R A B I.  
Postremo strabos oculos quoq; sic pro-  
curabis, ne ea consuetudo in naturam tran-  
seat. Principio cunas, in qbus infans iacet,  
ita colloca, ut infans lucem rectã aspiciat,  
neq; sursum, neq; in latus acie deflectere  
possit, Quod si in obliquum acie rapi, &  
limis

limis tueri iam cœperit, tum cunas rursum  
ita pone, ut ex diuerso latere lucem habeat  
cogaturq; ab eo latere, in quod acie deflex  
erat, in alterũ ac diuersum, dum lucem pe-  
tit reflectere. Noctu autem, lucernam quo-  
que in eandem partem pone, ut eius lumi-  
ne, ab eo latere, in quod acie deflexerat, in  
diuersum eodem modo reuocetur.

Præterea in eandem partem, à qua uis  
infantis in diuersum rapitur, aulaea ua-  
riegata, seu pannos illustrium colorum,  
præcipue Lutei & præsini suspende, ut eo-  
rum quoq; obiectu, uisus reuocetur. Nam  
dum crebro respiciet, ad ea quæ uisum alli-  
ciunt, acie ab ea parte cui iam asuescebat,  
in diuersam paulatim retorquebit. Atq;  
hæc eo usq; facere conueniet, donec rectã  
aciem recepisse uideatur. Nam si longius  
idem feceris, neq; modum certum observa-  
bis, periculum est, ne quod ab uno latere  
deriuabit, in alterum, studio uitãd i nimio,  
transferas.

Atq; hæc pro modo huius tum argumen-  
tum etiam libri, tradidisse sufficiat. Quæ  
si studiosis ac bonis, ut quiq; erunt, grata ac  
lectu


lectu digna uldebuntur , futurum cōfido,  
ut neq; illos lectōis suæ, neq; me laboris ac  
operæ unq̃ poeniteat . Neq; .n. tam impe-  
ritum aut inhumanum quenq̃ fore arbi-  
tror, qui, si quid durius aut minus scite hic  
à me dictum est, nō rei potius difficultati,  
& argumento à crebro scribentium usu  
remoto, q̃ mihi aut negligentia meæ tri-  
buendum esse iudicet .


Finis.

Sub initio operis, ubicunq; reperium-  
tur partium figuræ depictæ, ad subsequē-  
tem textum singulæ sunt referendæ, quod  
te commonitum, Lector, uolebam. Vale.


Frankofurti. xix. Octobris. 1532.


























































72025

RHODION

—  
DE PARTU  
HOMINIS